

1. У пацієнта виявлено недостатність мітрального клапана. Після фізичного навантаження у нього раптово виникли задишка, клекотливе дихання, виділення рожевого пінистого мокротиння. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

- A.** набряк легень
- B.** легенева кровотеча
- C.** гіпертонічний криз
- D.** астматичний статус
- E.** серцева астма

2. Як називається процедура, що полягає у введенні розчинів лікарських засобів через порожнину матки в маткові труби для визначення їх прохідності або з лікувальною метою?

- A.** гідротубація
- B.** пертубація
- C.** лапароскопія
- D.** кольпоскопія
- E.** гістероскопія

3. Щеплення новонароджених дітей від туберкульозу проводиться шляхом внутрішньошкірного введення вакцини БЦЖ. Яке ускладнення розвивається у разі випадкового потрапляння вакцини під шкіру?

- A.** «Холодний абсцес»
- B.** ліподистрофія
- C.** медикаментозна емболія
- D.** виразка
- E.** інфільтрат

4. Для профілактики якого ускладнення під час підшкірної ін'єкції олійного розчину потрібно відтягнути поршень шприца назад після проколу шкіри перед введенням препарату?

- A.** медикаментозної емболії
- B.** інфільтрату
- C.** гематоми
- D.** повітряної емболії
- E.** некрозу

5. Для якого захворювання характерні такі особливості аналізу сечі: сеча каламутна, з осадом і пластівцями, лейкоцитурія, бактеріурія, протеїнурія (менше 1 г/л)?

- A.** гострого пієлонефриту
- B.** гострого гломерулонефриту
- C.** хронічного гломерулонефриту
- D.** сечокам'яної хвороби
- E.** гострої ниркової недостатності

6. Жінка віком 28 років скаржиться на загальну слабкість і гострий біль у грудній клітці з правого боку, що посилюється під час глибокого вдиху та нахилі тулуба в протилежний бік. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка лежить на правому боці, дихання часте, поверхневе, температура тіла — 37,4°C, права половина грудної клітки відстає в акті дихання, перкуторно над легеньми визначається чіткий легеневий звук, аускультативно вислуховується шум тертя плеври. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A.** сухого плевриту
- B.** міжреберної невралгії
- C.** гострого бронхіту
- D.** ексудативного плевриту
- E.** негоспітальної пневмонії

7. Пацієнту встановлено діагноз: інсулінозалежний цукровий діабет. Яка тактика зменшить ризик розвитку атрофії підшкірної жирової клітковини під час інсулінотерапії?

- A.** зміна місця ін'єкції
- B.** використання інсулінових шприців
- C.** уведення підігрітого розчину інсуліну
- D.** повільне (упродовж 15-20 хв) введення інсуліну
- E.** уведення інсуліну за 15-20 хв до приймання їжі

8. У чоловіка віком 50 років раптово виник різкий, інтенсивний, стискальний, пекучий біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку та ліву лопатку. Біль триває впродовж 2-х годин, не знімається нітрогліцерином. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, відчуває страх смерті, шкіра та видимі слизові оболонки бліді, ціаноз губ, пульс — 84/хв, ритмічний, АТ — 130/80 мм рт. ст., тони серця ослаблені. На ЕКГ візуалізується патологічний зубець Q у відведеннях I, aVL і V1-V2. Для якого клінічного варіанта інфаркту міокарда це характерно?

- A.** ангінозного
- B.** астматичного
- C.** гастралгічного
- D.** аритмічного
- E.** церебрального

9. Для профілактики якого специфічного ускладнення черевного тифу на 3-му тижні хвороби пацієнту треба дотримуватися ліжкового режиму?

- A.** Кишкової кровотечі
- B.** Генералізації інфекції
- C.** Рецидиву захворювання
- D.** Розриву селезінки
- E.** Печінкової недостатності

10. У чоловіка віком 28 років у ділянці верхньої губи візуалізуються гіперемія шкіри та дрібні пухирці з гнійним умістом, вкриті жовтими кірками, піднижньоощелепний лімфаденіт. Для якої патології характерні ці симптоми?

- A.** Сикозу
- B.** Кандидозу
- C.** Мікроспорії
- D.** Імпетиго
- E.** Фурункулу

11. Як називається розмір площини входу в малий таз, що проходить між крижовим мисом та серединою верхньо-внутрішнього краю лобкового симфізу?

- A.** Прямий
- B.** Поперечний
- C.** Інтерспінальний
- D.** Косий
- E.** —

12. Жінка отримала опік передньої поверхні обох ніг, задньої поверхні тулуба та промежини. Визначте площу опікового ураження за «правилом дев'яток».

- A.** 37%
- B.** 25%
- C.** 39%
- D.** 51%
- E.** 19%

13. У пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Який лікарський засіб потрібно використати насамперед під час надання невідкладної допомоги пацієнту?

- A.** Епінефрин
- B.** Ампіцилін
- C.** Атропін
- D.** Еритроміцин
- E.** Диклофенак

14. У дівчини віком 19 років на шкірі грудної клітки, шиї, бічних поверхонь тулуба, міжлопаткової ділянки та плечей виявлено численні незапальні плями жовтувато-коричневого та блідо-рожевого кольору. Позитивні «симптом стружки» (лущення плям у разі пошкрябування) та йодна проба Бальцера. Для якого захворювання хара-

ктерні ці клінічні прояви?

- A.** Висівкоподібного лишаю
- B.** Контактного простого дерматиту
- C.** Справжньої екземи
- D.** Токсикодермії
- E.** Мікроспорії

15. У жінки під час статевого акту виник різкий біль у правій здухвинній ділянці з іррадіацією у відхідник. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, пульс — 110/хв, АТ — 100/60 мм рт. ст., температура тіла — 36,7°C, живіт здутий, напружений, болючий під час пальпації. З анамнезу відомо, що остання менструація була тиждень тому. Для якого невідкладного стану характерні ці симптоми?

- A.** Апоплексії яєчника
- B.** Ендометріозу
- C.** Позаматкової вагітності
- D.** Синдрому полікістозних яєчників
- E.** Хоріонепітеліоми

16. У чоловіка після тряскої їзди виникли сильний нападоподібний біль у поперековій ділянці, часті позиви до сечовипускання, нудота, блювання. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, пацієнт збуджений, намагається обрати положення тіла для полегшення болю. Які заходи долікарської допомоги доцільно застосувати в цьому разі?

- A.** Покласти грілку на поперекову ділянку
- B.** Покласти міхур із льодом на поперекову ділянку
- C.** Увести сечогінні препарати
- D.** Провести катетеризацію сечового міхура
- E.** Увести седативні препарати

17. У чоловіка внаслідок тривалої дії низької температури на тканини кінцівки розвинулися помірний колючий біль у ній, відчуття печіння. Об'єктивно спостерігається: шкіра в ділянці ураження бліда, після зігрівання стала набряклою, багряно-червоного кольору, з темно-синіми плямами. Укажіть ступінь відмороження.

- A.** I
- B.** II
- C.** III
- D.** IV
- E.** —

18. Пацієнтці віком 18 років діагностовано гострий гнійний менінгіт. Укажіть

особливості складу ліквору в цьому разі.

- A.** Клітинно-білкова дисоціація
- B.** Білково-клітинна дисоціація
- C.** Підвищення концентрації хлоридів
- D.** Підвищення рівня глюкози
- E.** —

19. Укажіть ранній і характерний симптом ураження мозкових оболонок.

- A.** Керніга
- B.** Пастернацького
- C.** Ортнера
- D.** Падалки
- E.** Грефе

20. Пацієнтка скаржиться на погіршення апетиту, неприємний присмак у роті, печію, тяжкість і розпирання в епігастральній ділянці після вживання їжі, нудоту та відрижку повітрям. Для якого виду диспепсії характерні ці клінічні прояви?

- A.** Шлункової
- B.** Кишкової (ентерогенної)
- C.** Печінкової (гепатобіліарної)
- D.** Панкреатогенної
- E.** —

21. Із якою метою флакон із вушними краплями перед застосуванням треба підігріти в руках до температури тіла людини?

- A.** Для уникнення запаморочення
- B.** Для попередження підвищення температури тіла
- C.** Для підсилення лікувального ефекту
- D.** Для кращої взаємодії з назальними краплями
- E.** Для попередження виникнення кашлю

22. У дівчини віком 22 роки через декілька місяців після незахищеного статевого акту над поверхнею шкіри великих соромітних губ з'явилися поодинокі рожеві утворення з тонкою ніжною (сосочкоподібні розростання). Який збудник, найімовірніше, спричинив розвиток таких клінічних проявів?

- A.** Папіломавірус
- B.** Трихомонада
- C.** Хламідія
- D.** Гарднерела
- E.** Протей

23. У пацієнта, який нещодавно повернувся з африканської країни та захворів

на інфекційне захворювання, спостерігається циклічний перебіг таких симптомів: раптовий тряский озноб триває 2-3 год, змінюється на жар (температура тіла досягає 40-41°C), що продовжується впродовж 3-5 год, після чого настає рясне профузне потовиділення. Виявлено збільшення печінки та селезінки, іктеричність шкіри, герпес губ. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A.** Малярії
- B.** Лептоспірозу
- C.** Висипного тифу
- D.** Вірусного гепатиту
- E.** Грипу

24. Яка дія електричного струму виявляється у подразненні збудливих тканин організму людини, що супроводжується мимовільним скороченням м'язів?

- A.** Біологічна
- B.** Магнітна
- C.** Термічна
- D.** Електролітична
- E.** —

25. Пацієнту неврологічного відділення встановлено попередній діагноз: субарахноїдальний крововилив. Із діагностичною метою йому призначено спинномозкову пункцію. Який колір ліквору є типовим для цього захворювання?

- A.** Червоний
- B.** Безбарвний
- C.** Білувато-жовтий
- D.** Сіро-зелений
- E.** Фіолетовий

26. Пацієнтка після апендектомії скаржиться на дворазове блювання, затримку газів і відсутність випорожнень. Об'єктивно спостерігається: шкіра землистого кольору, язик сухий, обкладений білим нальотом, передня черевна стінка напружена. Яке ускладнення розвинулося у пацієнтки в ранньому післяопераційному періоді?

- A.** Парез кишківника
- B.** Гострий холецистит
- C.** Гострий панкреатит
- D.** Гостра затримка сечі
- E.** Апоплексія яєчника

27. Укажіть надійніший метод діагностики вагітності на ранніх термінах.

- A.** Дослідження хоріонічного гонадотропіну в крові
- B.** Зовнішнє акушерське обстеження
- C.** Кольпоскопія
- D.** Бімануальне обстеження
- E.** Огляд шийки матки в дзеркалах

28. Роділлю проінформовано щодо активної тактики ведення третього періоду пологів. Розвиток якого ускладнення дозволяє попередити ця тактика?

- A.** Гіпотонічної кровотечі
- B.** Еклампсії
- C.** Порушення зсідання крові
- D.** Розриву матки
- E.** Емболії навколоплідними водами

29. У жінки з регулярним менструальним циклом спостерігається затримка менструації упродовж 5-ти тижнів. Результат тесту на вагітність — позитивний. Укажіть імовірну ознаку вагітності, яку можна виявити шляхом бімануального дослідження.

- A.** Зміна форми матки
- B.** Ціаноз слизової оболонки піхви
- C.** Пігментація шкіри обличчя
- D.** Нагрубання грудних залоз
- E.** Збільшення об'єму живота

30. Дитина народилася в терміні гестації 39 тижнів із масою тіла 3800 г. У неонатальному періоді спостерігалися тривала жовтяниця, пізні відпадання пупкового канатика та повільне загоєння пупкової ранки, зниження фізіологічних рефлексів, гіпотрофія м'язів, щільні набряки на тильних поверхнях кистей та ступнів, непропорційно велика голова, збільшення губ і язика. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

- A.** Вродженого гіпотиреозу
- B.** Акромегалії
- C.** Вродженої вади серця
- D.** Дифузного токсичного зоба
- E.** Рахіту

31. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на тупий ниючий біль у правому підребер'ї з іррадіацією у праве плече, що посилюється після вживання гострої їжі, відчуття розпирання в животі, відрижку, нудоту, гіркий присмак у роті, загальну слабкість. Під час пальпації живота визначається болючість у правому підребер'ї, позитивні симптоми Кера та Ортнера. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A.** Хронічного холециститу
- B.** Гострого апендициту
- C.** Виразкової хвороби шлунка
- D.** Неспецифічного виразкового коліту
- E.** Кишкової непрохідності

32. У роділлі під час перебігу першого періоду пологів з'явилися кров'янисті виділення зі статевих шляхів. За результатами зовнішнього акушерського обстеження виявлено високе розташування передлеглої частини плода, що характерне для передлежання плаценти. Укажіть достовірний метод діагностики цієї патології.

- A.** Ультразвукове дослідження
- B.** Прийоми Леопольда-Левицького
- C.** Пальцеве дослідження ділянки внутрішнього вічка
- D.** Огляд шийки матки за допомогою гінекологічних дзеркал
- E.** Вимірювання висоти стояння дна матки

33. Який із нижченаведених клінічних проявів характерний для передлежання плаценти?

- A.** Кровотеча зі статевих шляхів (часто повторна), що не супроводжується больовим синдромом
- B.** Гіпертонус матки, больовий синдром
- C.** Такікардія, підвищення артеріального тиску
- D.** Прискорення серцебиття у плода
- E.** Гострий біль у проекції локалізації плаценти, дистрес-синдром у плода

34. Який із нижченаведених методів дослідження використовується для визначення видільної функції нирок?

- A.** Екскреторна (внутрішньовенна) урографія
- B.** Загальноклінічний аналіз сечі
- C.** Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини
- D.** Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини
- E.** Аналіз сечі за методом Нечипоренка

35. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на загальну слабкість, задишку, прискорене серцебиття та спотворення смаку (їсть сиру гречку, крейду). В анамнезі: рясні менструації. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів і слизових оболонок, волосся тонке, посічене, пульс — 90/хв, ритмічний, АТ — 100/60 мм рт. ст., тони серця ослаблені, систолічний шум над

верхівкою серця. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

- A.** Залізодефіцитної анемії
- B.** Гемофілії
- C.** Геморагічного васкуліту
- D.** Хвороби Верльгофа
- E.** Апластичної анемії

36. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на загальну слабкість, задишку, серцебиття, пощипування язика, зниження апетиту, утруднення під час ходьби, відчуття оніміння в кінцівках. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда з лимонним відтінком, язик гладкий, глянцекий, з атрофією сосочків. Живіт під час пальпації м'який, не болючий, печінка виступає з-під краю реберної дуги на 1,5 см. У загальному аналізі крові: еритроцити — $1,2 \cdot 10^{12}/\text{л}$, гемоглобін — 58 г/л, КП — 1,4, виявлено тільця Жоллі та кільця Кебота, макроцитоз. Для якого виду анемії характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A.** Вітамін B_{12} -дефіцитної
- B.** Гострої постгеморагічної
- C.** Апластичної
- D.** Залізодефіцитної
- E.** Аутоімунної гемолітичної

37. Для проведення проби якості передстерилізаційного очищення медичного інструментарію сестра медична приготувала робочий розчин азіпіраму, змішавши в рівних об'ємах початковий розчин азіпіраму з 3%-м розчином перекису водню. Укажіть термін зберігання робочого реактиву.

- A.** 2 год
- B.** 6 год
- C.** 3 год
- D.** 1 місяць
- E.** 1 добу

38. В якій клінічній ситуації сестрі медичній рекомендовано (показано) використання нестерильних (оглядових) медичних рукавичок?

- A.** У разі ризику контакту з кров'ю чи іншими біологічними рідинами
- B.** Під час вимірювання артеріального тиску
- C.** Під час приготування препаратів для парентерального харчування
- D.** У разі транспортування пацієнта до іншого відділення
- E.** Під час збору і заміни постільної білизни

39. У пацієнта після фізичного навантаження виник стискальний біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку, триває близько 5 хв. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, шкірні покриви бліді, вологі, пульс — 80/хв, АТ — 130/70 мм рт. ст., тони серця ритмічні, звучні. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

- A.** Напад стенокардії
- B.** Гіпертензивний криз
- C.** Колапс
- D.** Інфаркт міокарда
- E.** Кардіогенний шок

40. У маніпуляційному кабінеті під час взяття крові з вени пацієнт знепритомнів. Яке положення тіла потрібно забезпечити пацієнту під час надання невідкладної медичної допомоги?

- A.** Горизонтальне, з піднятими вище рівня голови ногами
- B.** Горизонтальне, з піднятим головним кінцем ліжка
- C.** Напівсидяче, з опущеними донизу ногами
- D.** Сидяче, із нахиленим вперед тулубом
- E.** Горизонтальне, лежачи на боку

41. Укажіть сучасний метод дослідження стану легень, що використовується для визначення функції зовнішнього дихання та проводиться з метою діагностики, оцінки тяжкості та моніторингу перебігу ХОЗЛ.

- A.** Спірометрія
- B.** Пульсоксиметрія
- C.** КТ легень
- D.** Велоергометрія
- E.** УЗД легень

42. У пацієнта віком 32 роки раптово вночі з'явилася експіраторна задишка, що супроводжується сухим кашлем, відчуттям стиснення в грудній клітці. Об'єктивно спостерігається: пацієнт займає вимушене положення (сидить, спираючись руками на край ліжка), на відстані чути сухі свистячі хрипи,

в акті дихання бере участь додаткова мускулатура. Перкуторно над легенями визначається коробковий звук. Аускультативно вислуховується безліч сухих свистячих хрипів. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- A.** Напад бронхіальної астми
- B.** Напад стенокардії
- C.** Сухий плеврит
- D.** Гострий бронхіт
- E.** набряк легень

43. У семирічної дитини після внутрішньовенного введення антибіотика з'явилися слабкість, пульсуючий головний біль, відчуття стиснення в грудях та нестачі повітря, надсадний кашель. Об'єктивно спостерігається: різка блідість шкірних покривів, експіраторна задишка, дистанційні хрипи. Для якого варіанта перебігу анафілактичного шоку характерні ці симптоми?

- A.** Асфіктичного
- B.** Гемодинамічного
- C.** Церебрального
- D.** Абдомінального
- E.** Змішаного

44. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на нападоподібний біль у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече та праву ключицю, гіркоту в роті, нудоту. Виникнення цих симптомів пов'язує із вживанням смаженої їжі. Об'єктивно спостерігається: пацієнт неспокійний, язик обкладений жовтим нальотом, пульс — 88/хв, ритмічний, АТ — 120/80 мм рт. ст. Живіт під час пальпації м'який, болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Кера. Препарати якої групи потрібно застосувати насамперед для надання невідкладної допомоги?

- A.** Спазмолітики
- B.** Стимулятори перистальтики
- C.** Ентеросорбенти
- D.** Проносні
- E.** Протимікробні

45. У пацієнта терапевтичного відділення діагностовано виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. Яка бактерія спричиняє це захворювання?

- A.** *Helicobacter pylori*
- B.** *Staphylococcus aureus*
- C.** *Streptococcus*
- D.** *Salmonella*
- E.** *Escherichia coli*

46. Пацієнт віком 55 років, який зловживає алкоголем, скаржиться на нападоподібний стискальний біль у верхній частині живота, що з'являється або посилюється після вживання великої кількості жирної їжі, спиртних напоїв, іррадіює у спину (оперізуючий біль) та супроводжується нудотою, блюванням, що не приносить полегшення, метеоризм, рідкі випорожнення. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, суха, язик обкладений білим нальотом, пульс — 86/хв, АТ — 100/60 мм рт. ст., живіт під час пальпації болючий у лівому підребер'ї в зоні Шоффара та в точці Мейо-Робсона. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A.** Хронічного панкреатиту
- B.** Гострого апендициту
- C.** Виразкової хвороби шлунка
- D.** Гострої кишкової інфекції
- E.** Кишкової непрохідності

47. Для якого захворювання характерна поява таких клінічних проявів (великих діагностичних критеріїв): кардит, поліартрит, мала хорея, кільцеподібна еритема та підшкірні вузлики?

- A.** Гострої ревматичної гарячки
- B.** Ревматоїдного артриту
- C.** Системної склеродермії
- D.** Системного червоного вовчака
- E.** Деформуючого остеоартрозу

48. Пацієнт віком 57 років скаржиться на біль у дрібних суглобах кистей, що виникає в другій половині ночі, ранкову скутість, загальну слабкість, зниження працездатності. Об'єктивно спостерігається: набряк і почервоніння п'ястково-фалангових і міжфалангових суглобів обох рук, деформація суглобів у вигляді «плавників моржа». Попередній діагноз: ревматоїдний артрит. Який із нижченаведених методів дослідження є найінформативнішим для уточнення діагнозу?

- A.** Рентгенографія кистей
- B.** Рентгенографія органів грудної клітки
- C.** Загальний аналіз сечі
- D.** Ехокардіографія
- E.** Електрокардіографія

49. Укажіть специфічну лабораторну ознаку системного червоного вовчака.

- A.** Наявність LE-клітин
- B.** Прискорення ШОЕ
- C.** Підвищення рівня С-реактивного білка
- D.** Диспротеїнемія
- E.** Нейтрофільний лейкоцитоз зі зсувом лейкоцитарної формули вліво

50. Відповідно до призначення лікаря дитині потрібно парентерально ввести 350000 ОД антибіотика з групи цефалоспоринів III покоління. У флаконі міститься 1000 мг діючої речовини. Скільки мілілітрів розчину антибіотика потрібно ввести дитині, якщо застосувати стандартне розведення?

- A.** 3,5 мл
- B.** 10 мл
- C.** 1,5 мл
- D.** 5 мл
- E.** 35 мл

51. Як називається доза лікарського засобу, що призначається на один прийом?

- A.** Разова
- B.** Добова
- C.** Токсична
- D.** Максимальна
- E.** Мінімальна

52. Укажіть постін'єкційне ускладнення, що характеризується гнійним запаленням м'яких тканин та утворенням порожнини, заповненої гноем.

- A.** Абсцес
- B.** Інфільтрат
- C.** Емболія
- D.** Некроз
- E.** Флебіт

53. Пацієнту призначено фізіотерапевтичну процедуру, під час якої (внаслідок змінення проникності судинної стінки) у шкірі виникають точкові мікрокрововиливи (петехії, плями), до складу яких входять біологічно активні речовини, що надають потужний стимулювальний ефект як на весь організм, так і на певну зону до повного їх розсмоктування. Яку процедуру призначено пацієнту?

- A.** Вакуум-терапію медичними банками
- B.** Накладання гірчичників
- C.** Застосування медичної грілки
- D.** Накладання зігрівального компресу
- E.** УВЧ-терапію

54. У пацієнта, який хворіє на виразко-

ву хворобу шлунка, раптово розпочалося блювання «кавовою гущею». Які заходи невідкладної допомоги треба провести насамперед на догоспітальному етапі?

- A.** Прикласти міхур із льодом на ділянку епігастрія
- B.** Промити шлунок
- C.** Застосувати ентеросорбенти
- D.** Прикласти медичну грілку на ділянку епігастрія
- E.** Застосувати протиблювотні препарати

55. Пацієнт хворіє на хронічний спастичний коліт. Який найпростіший фізіотерапевтичний засіб місцевого впливу застосовується для зменшення болю в животі у разі розвитку кишкової коліки?

- A.** Медична грілка
- B.** Медичні банки
- C.** Гірчичники
- D.** Міхур із льодом
- E.** Медичні п'явки

56. Пацієнт віком 35 років скаржиться на прогресуючу слабкість, рясну пітливість, біль у горлі під час ковтання, періодичні кровотечі з носа та ясен. Об'єктивно спостерігається: болючі афти в порожнині рота, гіпертрофічний гінгівіт, виразково-некротичні зміни в горлі, збільшення периферичних лімфатичних вузлів, гепатоспленомегалія. Для якого з нижченаведених захворювань характерні такі клінічні прояви?

- A.** Гострого лейкозу
- B.** Гемофілії
- C.** Залізодефіцитної анемії
- D.** Апластичної анемії
- E.** Постгеморагічної анемії

57. У п'ятирічної дитини, яка відвідує дитячий дошкільний заклад, спостерігається підвищення температури тіла, біль у горлі. Під час огляду виявлено блідість носогубного трикутника, «малиновий язик» та дрібнопапульозний висип на гіперемованій шкірі, що максимально локалізується на згинальних поверхнях кінцівок, у складках шкіри. Укажіть термін ізоляції хворої дитини.

- A.** 22 дні
- B.** 21 день
- C.** 5 днів від моменту появи висипань
- D.** 5 днів від початку захворювання
- E.** 7 днів

58. У пологовій залі породіллі запропонували провести перше раннє прикладання новонародженої дитини до грудей. Ця процедура покращує скорочення матки та сприятиме відшаруванню й народженню посліду. Стимуляція синтезу якого гормону відбувається в цьому разі?

- A.** Окситоцину
- B.** Вазопресину
- C.** Адренкортикотропного
- D.** Соматотропіну
- E.** Хоріонічного гонадотропіну

59. Як називається графічне відображення результатів динамічного спостереження під час пологів за процесом розкриття шийки матки та просування голівки плода, пологовою діяльністю, станом матері та плода?

- A.** Партограма
- B.** Міограма
- C.** Токограма
- D.** Кардіограма
- E.** Спірограма

60. У вагітної жінки віком 42 роки під час вимірювання зовнішніх розмірів та за з'ясувалося, що зовнішня кон'югата становить 15 см. Яка тактика ведення пологів у цьому разі?

- A.** Кесарів розтин
- B.** Накладання акушерських щипців
- C.** Вакуум-екстракція плода
- D.** Стимуляція пологів
- E.** Витягання плода за тазовий кінець

61. Який симптом найхарактерніший для хронічного гастриту з підвищеною секреторною функцією шлунка?

- A.** Печія
- B.** Дисфагія
- C.** Діарея
- D.** Гикавка
- E.** Метеоризм

62. Пацієнт віком 39 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, появу набряків на обличчі, тупий біль у поперековій ділянці, підвищення температури тіла до $37,5^{\circ}\text{C}$, зменшення виділення сечі та зміну її кольору («м'ясні помії»). Хворіє впродовж 2-х тижнів. В анамнезі: хронічний тонзиліт. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, АТ — 160/100 мм рт. ст. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A.** Гострого гломерулонефриту
- B.** Ниркової коліки
- C.** Гострого пієлонефриту
- D.** Хронічної хвороби нирок
- E.** Гострого циститу

63. Пацієнт, який проживає в гірській місцевості, скаржиться на відчуття стиснення в ділянці ший, розлади ковтання, сухий кашель, утруднене дихання. Об'єктивно спостерігається: рівномірне дифузне збільшення щитоподібної залози без локальних ущільнень. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A.** Ендемічного зоба
- B.** Дифузного токсичного зоба
- C.** Аутоімунного тиреоїдиту
- D.** Гіпотиреозу
- E.** Підгострого тиреоїдиту

64. У пацієнтки з діагнозом: дифузний токсичний зоб, після тяжкого емоційного перенавантаження раптово підвищилася температура тіла до 40°C , з'явилося рясне потовиділення, нудота, блювання, профузна діарея. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка збуджена, свідомість порушена, слизові оболонки сухі, АТ — 220/105 мм рт. ст., пульс — 180/хв. Яке ускладнення розвинулося в пацієнтки?

- A.** Тиреотоксичний криз
- B.** Гіпертензивний криз
- C.** Гіперглікемічна кома
- D.** Набряк мозку
- E.** Гіпоглікемічна кома

65. У пацієнта на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда раптово погіршився загальний стан, посилився біль у серці, виникла різка слабкість. Об'єктивно спостерігається: свідомість сплутана, акроціаноз, холодний липкий піт, АТ — 70/30 мм рт. ст., пульс — 110/хв, слабого наповнення. Яке ускладнення розвинулося в пацієнта?

- A.** Кардіогенний шок
- B.** Серцева астма
- C.** Набряк легень
- D.** Тромбоемболія легеневої артерії
- E.** Нестабільна стенокардія

66. Який із нижченаведених заходів потрібно порекомендувати пацієнту, який хворіє на артеріальну гіпертензію, для досягнення максимального зниження ризику розвитку серцево-судинних ускладнень?

- A.** Модифікацію способу життя
- B.** Рефлексотерапію
- C.** Психотерапію
- D.** Санаторно-курортне лікування
- E.** Нетрадиційні методи лікування

67. Якої тактики необхідно дотримуватися для запобігання некрозу тканин під час внутрішньовенного введення гіпертонічного розчину?

- A.** Не допускати потрапляння розчину в паравенозний простір
- B.** Перед застосуванням розчин потрібно підігріти
- C.** Перевірити кут і глибину введення голки
- D.** Змінювати місце введення лікарського засобу
- E.** Ретельно мити руки перед процедурою

68. Який прилад дозволяє виміряти пікову швидкість форсованого видиху та використовується для діагностики та оцінки ефективності лікування хронічних обструктивних захворювань легень (бронхіальної астми, хронічного обструктивного бронхіту тощо)?

- A.** Пікфлоуметр
- B.** Глюкометр
- C.** Пульсоксиметр
- D.** Тонometr
- E.** Радіометр

69. У пацієнта затяжний напад бронхіальної астми завершився розвитком астматичного статусу. Який показник є ключовим для призначення оксигено-терапії?

- A.** Рівень сатурації
- B.** Частота дихальних рухів
- C.** Температура тіла
- D.** Вік пацієнта понад 50 років
- E.** Тривалість хвороби

70. У пацієнта терапевтичного відділення, який хворіє на виразкову хворобу шлунка, виник закріп. Укажіть захід долікарської допомоги пацієнту в цьому разі.

- A.** Застосувати очисну клізму
- B.** Покласти міхур із льодом на живіт
- C.** Покласти грілку на живіт
- D.** Запропонувати тепле питво
- E.** Промити шлунок

71. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунка, з'явилися скарги на швидку втомлюваність, втрату апети-

ту, відразу до м'ясної їжі, посилене слиновиділення, порушення ковтання. Для якого ускладнення характерні ці симптоми?

- A.** Малігнізації
- B.** Перфорації
- C.** Пенетрації
- D.** Пілоростенозу
- E.** Шлункової кровотечі

72. Який лікарський засіб використовується для замісної терапії у разі недостатності зовнішньосекреторної функції підшлункової залози?

- A.** Панкреатин
- B.** Метоклопрамід
- C.** Папаверин
- D.** Платифілін
- E.** Активоване вугілля

73. Сестра медична, щоденно вимірюючи температуру тіла пацієнта та реєструючи її графічно в температурному листку зафіксувала, що різниця між ранковими і вечірніми її показниками становить 2-2,5°C. Укажіть тип гарячки.

- A.** Послаблювальна
- B.** Постійна
- C.** Гектична
- D.** Хвилеподібна
- E.** Переміжна

74. Пацієнт скаржиться на часті рідкі випорожнення, метеоризм, бурчання та відчуття переливання рідини в животі. Для якого виду диспепсії характерні ці клінічні прояви?

- A.** Кишкової (ентерогенної)
- B.** Шлункової
- C.** Печінкової (гепатобіліарної)
- D.** Панкреатогенної
- E.** —

75. У пацієнта спостерігається загострення хронічного пієлонефриту. Яке обстеження доцільно провести перед призначенням антибіотикотерапії?

- A.** Бактеріологічний аналіз сечі
- B.** Аналіз сечі на α -амілазу
- C.** Біохімічний аналіз крові
- D.** Екскреторну урографію
- E.** Хромоцистоскопію

76. У пацієнта з хронічною нирковою недостатністю швидкість клубочкової фільтрації становить 14 мл/хв. До якої лікувальної процедури необхідно підго-

тувати пацієнта в цьому разі?

- A.** Гемодіалізу
- B.** Шунтування
- C.** Літотрипсії
- D.** Лапароцентезу
- E.** Фонофорезу

77. Пацієнтка скаржиться на ранкову скутість, деформацію і постійний біль у дрібних суглобах, зниження фізичної активності. Об'єктивно спостерігається: симетричні згинальні контрактури дрібних суглобів. На рентгенограмі кисті й зап'ястка — ерозії та виражений остеопороз безпосередньо прилеглих до суглоба кісток, анкілоз. Для якого захворювання це характерно?

- A.** Ревматоїдного артрит
- B.** Ревматичного поліартриту
- C.** Деформуючого остеоартрозу
- D.** Системного червоного вовчака
- E.** Системного васкуліту

78. У тяжкохворого лежачого пацієнта на шкірі п'яток та ліктів виявлено зону стійкої гіперемії, цілісність шкіри не порушена. Визначте стадію розвитку пролежня.

- A.** I
- B.** II
- C.** III
- D.** IV
- E.** —

79. Які лікарські засоби найчастіше викликають медикаментозну алергію?

- A.** Антибіотики
- B.** Сечогінні
- C.** Гіпотензивні
- D.** Проносні
- E.** Ентеросорбенти

80. Яке дослідження проводиться для виявлення прихованої коронарної недостатності та ранньої діагностики стенокардії?

- A.** Велоергометрія
- B.** Енцефалографія
- C.** Спірографія
- D.** Аудиометрія
- E.** Нейроміографія

81. Пацієнта віком 27 років, який хворіє на цукровий діабет 1-го типу, шпиталізовано до лікарні в непритомному стані. Об'єктивно спостерігається: шкіра волога, тризм жувальних м'язів, тонус очних яблук у нормі, пульс — 66/хв, АТ

— 125/80 мм рт. ст., дихання рівномірне, поверхневе. Попередній діагноз: гіпоглікемічна кома. Який лікарський засіб потрібно застосувати для надання невідкладної допомоги пацієнту в цьому разі?

- A.** 40%-й розчин глюкози в/в
- B.** 5%-й розчин глюкози в/в
- C.** 10%-й розчин натрію хлорид в/в краплинно
- D.** 2,5%-й розчин гідрокортизону в/м
- E.** 0,1 %-й розчин адреналіну п/ш

82. У пацієнтки температура тіла швидко, протягом декількох годин, знизилася з 39,5°C до 37°C (критичний варіант зниження температури) та розвинулися загальна слабкість, запаморочення, шум у вухах, прискорене серцебиття. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви та слизові бліді, холодний липкий піт, кінцівки холодні, дихання поверхневе, часте, пульс — 98/хв, слабкого наповнення, АТ — 80/50 мм рт. ст. Який препарат використовується для надання невідкладної допомоги у цьому разі?

- A.** 1%-й розчин мезатону
- B.** 2%-й розчин дротаверину
- C.** 0,2%-й розчин платифіліну
- D.** 2%-й розчин папаверину
- E.** 1%-й розчин супрастину

83. У пацієнта віком 50 років після емоційного перенавантаження виникли інтенсивний стискальний пекущий біль за грудниною, що іррадіює в ліву руку, відчуття страху смерті, різка загальна слабкість. Через 30 хв після сублінгвального приймання нітрогліцерину біль не припинився. Тест на тропонін I у крові позитивний. Для якого захворювання характерні такі клініко-лабораторні показники?

- A.** Інфаркту міокарда
- B.** Стабільної стенокардії
- C.** Стенокардії напруги
- D.** Перикардиту
- E.** Міжреберної невралгії

84. Пацієнт віком 37 років скаржиться на кашель із виділенням великої кількості мокротиння з неприємним запахом, інколи «повним ротом», задишку, періодичне підвищення температури тіла та зниження працездатності. Об'єктивно спостерігається: мокротиння гнійно-слизового характеру, розширене. Для якого захворювання хара-

ктерні ці клінічні прояви?

- A.** Бронхоектатичної хвороби
- B.** Негоспітальної пневмонії
- C.** Сухого плевриту
- D.** Гострого бронхіту
- E.** Ексудативного плевриту

85. У пацієнтки віком 55 років після емоційного перенавантаження з'явилися скарги на головний біль у потиличній ділянці, запаморочення, мерехтіння «мушок» перед очима, шум і дзвін у вухах, блювання. Об'єктивно спостерігається: пульс — 98/хв, ритмічний, АТ — 190/100 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся у пацієнтки?

- A.** Гіпертензивний криз
- B.** Тиреотоксичний криз
- C.** Кардіогенний шок
- D.** Анафілактичний шок
- E.** Колапс

86. У пацієнта після парентерального введення антибіотика розвинувся анафілактичний шок. Яка ділянка тіла використовується для первинного внутрішньом'язового введення епінефрину під час надання невідкладної допомоги?

- A.** Зовнішня поверхня стегна
- B.** Внутрішня поверхня стегна
- C.** Зовнішня поверхня передпліччя
- D.** Внутрішня поверхня плеча
- E.** Внутрішня поверхня передпліччя

87. Який об'єм антисептика необхідно використати для проведення однієї процедури гігієнічної обробки рук перед виконанням внутрішньовенної ін'єкції?

- A.** 3 мл
- B.** 5 мл
- C.** 9 мл
- D.** 6 мл
- E.** 1 мл

88. Укажіть засіб, яким потрібно промити неушкоджену шкіру у разі потрапляння на неї крові або інших потенційно небезпечних біологічних рідин.

- A.** Водою з милом
- B.** Антисептиком
- C.** Фізіологічним розчином
- D.** Дезінфікуючим розчином
- E.** Етиловим спиртом

89. Укажіть дозволений максимальний відсоток заповнення ємності (коробки безпечного зберігання) для медичних відходів категорії B.

- A.** 75%
- B.** 60%
- C.** 55%
- D.** 50%
- E.** 45%

90. Пацієнта віком 25 років шпиталізовано бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги до лікарні у непритомному стані. З анамнезу відомо, що пацієнт хворіє на цукровий діабет 1-го типу та вводить інсулін. Об'єктивно спостерігається: блідість і вологість шкірних покривів, підвищення м'язового тонусу, судоми, розширення зіниць, тонус очних яблук не змінений. Рівень глюкози у крові — 2,2 ммоль/л. Який вид коми розвинувся в пацієнта?

- A.** Гіпоглікемічна
- B.** Уремічна
- C.** Діабетична
- D.** Гіперосмолярна
- E.** Мозкова

91. У дванадцятирічного пацієнта попередній діагноз: епілепсія. Який метод обстеження потрібно використати для графічної реєстрації біоелектричної активності головного мозку та підтвердження діагнозу?

- A.** Електроенцефалографія
- B.** Ультразвукове дослідження головного мозку
- C.** Комп'ютерна томографія головного мозку
- D.** Магнітно-резонансна томографія головного мозку
- E.** Електрокардіографія

92. У пацієнтки віком 67 років раптово розвинулися загальна слабкість, запаморочення, оніміння лівої верхньої кінцівки, погіршення мовлення та зору. Симптоми зберігаються понад 24 год. В анамнезі: ішемічна хвороба серця, перенесений інфаркт міокарда. Для якого порушення мозкового кровообігу характерні ці клінічні прояви?

- A.** Ішемічного інсульту
- B.** Геморагічного інсульту
- C.** Транзиторної ішемічної атаки
- D.** Дисциркуляторної енцефалопатії
- E.** —

93. До якої фармакологічної групи належить діазепам?

- A.** Транквілізаторів
- B.** Антikonвульсантів
- C.** Ноотропів
- D.** Міорелаксантів
- E.** Антидепресантів

94. Який із нижченаведених факторів забезпечує швидкість появи терапевтичного ефекту у разі сублінгвального застосування лікарських засобів?

- A.** Інтенсивна васкуляризація під'язикового простору
- B.** pH слини
- C.** Біологічна доступність препаратів
- D.** Склад (діюча речовина та допоміжні речовини) препаратів
- E.** Біохімічний склад слини

95. Пацієнту віком 49 років встановлено попередній діагноз: ексудативний плеврит. До якої діагностичної процедури сестрі медичній потрібно підготувати пацієнта в цьому разі?

- A.** Торакоцентезу
- B.** Люмбальної пункції
- C.** Бронхоскопії
- D.** Абдомінальної пункції
- E.** Спірометрії

96. Пацієнт віком 38 років скаржиться на сильний різкий нападоподібний біль у ділянці правого підребер'я, що іррадіює в праву ключицю та плече, гіркоту в роті, нудоту, блювання жовчу. В анамнезі: жовчнокам'яна хвороба. Об'єктивно спостерігається: пацієнт неспокійний, язик обкладений жовтим нальотом, іктеричність склер та шкірних покривів, пульс — 82/хв, ритмічний, АТ — 110/70 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

- A.** Печінкова колика
- B.** Гострий панкреатит
- C.** Ниркова колика
- D.** Гострий гастрит
- E.** Кишкова колика

97. Пацієнту віком 27 років, який лікується в нефрологічному відділенні, призначено дослідження сечі за методом Нечипоренка. На чому ґрунтується цей метод?

- A.** Визначенні кількості формених елементів і циліндрів в 1 мл осаду сечі
- B.** Дослідженні концентраційної здатності нирок
- C.** Визначенні кількості формених елементів у добовій кількості сечі
- D.** Встановленні щільності сечі та її густини в окремих порціях
- E.** Визначенні кількості формених елементів, що виділяються з сечею за 1 хв

98. Яка група лікарських засобів використовується для етіологічного лікування гострого пієлонефриту?

- A.** Нітрофурани
- B.** Жовчогінні
- C.** Ферменти
- D.** Антациди
- E.** Ентеросорбенти

99. Який із нижченаведених чинників належить до немодифікованих (незмінних) факторів ризику розвитку артеріальної гіпертензії?

- A.** Вік
- B.** Ожиріння
- C.** Гіперліпідемія
- D.** Гіподинамія
- E.** Стрес

100. Який прилад використовується для моніторингу інтенсивності бактерицидного потоку ультрафіолетового випромінювання під час знезараження повітря в приміщенні за допомогою УФБ-опромінювача?

- A.** Радіометр
- B.** Гігрометр
- C.** Вольтметр
- D.** Динамометр
- E.** Барометр

101. Укажіть механізм дії медичної грілки у разі її місцевого застосування.

- A.** Розширення (вазодилатація) судин шкіри та нижчерозташованих тканин
- B.** Звуження (вазоконстрикція) судин шкіри та нижчерозташованих тканин
- C.** Збільшення напруги м'язів
- D.** Дезінфекція та підсушування ушкоджених ділянок шкіри
- E.** Уповільнення обмінних процесів

102. Пацієнт скаржиться на біль у грудній клітці, особливо під час кашлю та глибокому диханні. Аускультативно в нижньообовому відділі грудної клітки на невеликій її ділянці вислуховується

патологічний шум, який добре чути на вдиху та видиху, не змінює інтенсивність під час кашлю, може відчуватися долонею під час пальпації грудної клітки. Укажіть цей патологічний шум.

- A.** Шум тертя плеври
- B.** Крепітація
- C.** Голосове тремтіння
- D.** Жорстке дихання
- E.** Амфоричне дихання

103. У роділлі, яка народжує вдруге, триває другий період пологів. Під час прорізування голівки після потуги ЧСС плода становить 80/хв. Укажіть подальшу тактику ведення пологів.

- A.** Провести епізіотомію під місцевим знеболенням
- B.** Продовжити очікувальну тактику
- C.** Провести кесарів розтин
- D.** Забезпечити стимулювання пологів
- E.** Провести плодоруйнівну операцію

104. Яке ускладнення може розвинути-ся в пацієнта у разі безконтрольного приймання адреноміметиків під час нападу бронхіальної астми?

- A.** Астматичний статус
- B.** Набряк легень
- C.** Пневмоторакс
- D.** Пневмонія
- E.** Серцева астма

105. У жінки протягом 1 год після вживання шоколаду на шкірі тулуба та кінцівок з'явився висип у вигляді поліморфних папул блідо-рожевого кольору, що супроводжується свербіжем. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 37,6°C, пульс — 80/хв, АТ — 110/70 мм рт. ст. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?

- A.** Кропив'янки
- B.** Кору
- C.** Анафілактичного шоку
- D.** Набряку Квінке
- E.** Сироваткової хвороби

106. У чоловіка через декілька годин після вживання неякісної їжі з'явилися біль у животі, блювання, яке приносить полегшення, часті рідкі випорожнення. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 37,6°C, язик сухий, із білувато-сірим нальотом, випорожнення не стійкі. Живіт під час пальпації м'який, болючий в епігастральній ділянці, симптомів подразнення очеревини не виявлено. Яке захворювання, на-

йімовірніше, розвинулося в пацієнта?

- A.** Гострий гастрит
- B.** Гострий панкреатит
- C.** Виразкова хвороба шлунка
- D.** Гострий апендицит
- E.** Кишкова непрохідність

107. Як називається шлях передачі інфекції, що може бути пов'язаний із проведенням інвазивних лікувально-діагностичних процедур?

- A.** Артифіційний
- B.** Вертикальний
- C.** Аліментарний
- D.** Рановий
- E.** Контактно-побутовий

108. У чоловіка, якого вжалила бджола, через декілька хвилин на шкірі тулуба з'явився висип у вигляді блідо-рожевих міхурців, що супроводжується свербіжем, підвищилася температура тіла до 37,5°C, розвинувся біль у животі. Які препарати використовуються для лікування пацієнта в цьому разі?

- A.** Супрастин, тавегіл
- B.** Ацетилсаліцилова кислота, аспаркам
- C.** Смекта, ентеросгель
- D.** Фуросемід, гіпотіазид
- E.** Дигоксин, корглікон

109. Пацієнту віком 27 років діагностовано кропив'янку. Які продукти потрібно виключити з раціону харчування пацієнта в цьому разі?

- A.** Шоколад, мед
- B.** Оливкову олію, зерновий хліб
- C.** Каші з вівсяної та гречаної крупи
- D.** Макаронні вироби з твердих сортів пшениці
- E.** Кабачки, капуста

110. Укажіть ділянку локалізації набряку Квінке, що є потенційно небезпечним для життя.

- A.** Гортань
- B.** Губи
- C.** Вушні раковини
- D.** Статеві органи
- E.** Повіки

111. Восьмирічний хлопчик хворіє на епідемічний паротит. На 7-ий день від початку захворювання на тлі високої гарячки виникли нудота, блювання, переймоподібний оперізувальний біль у животі, рідкі випорожнення. Ураження якого органа відбулося в дитини?

- A.** Підшлункової залози
- B.** Яєчок
- C.** Головного мозку
- D.** Кишківника
- E.** Нирок

112. Укажіть ранній симптом цукрового діабету.

- A.** Полідипсія
- B.** Анурія
- C.** Анорексія
- D.** Депресія
- E.** Ейфорія

113. Який із нижченаведених симптомів характерний для перебігу гострого пієлонефриту в дітей першого року життя?

- A.** Блювання
- B.** Кашель
- C.** Задишка
- D.** Закреп
- E.** Гіпертензія

114. У дев'ятирічного хлопчика спостерігаються сухий кашель із виділенням слизово-гнійного мокротиння, підвищення температури тіла до 38,9°C та задишка. Над правою легенею визначається вкорочення перкуторного звуку. Аускультативно вислуховується ослаблене дихання та дрібноміхурцеві вологі хрипи. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A.** Пневмонії
- B.** Бронхіту
- C.** Ларингіту
- D.** Бронхіоліту
- E.** Плевриту

115. У породіллі через дві доби після пологів розпочалася кровотеча зі статевих шляхів, крововтрата досягла 500 мл і продовжується. Пацієнтка скаржиться на слабкість, пітливість. Об'єктивно спостерігається: слизові оболонки бліді, пульс — 95/хв, слабкого наповнення, АТ — 100/60 мм рт. ст. Під час пальпації матки через передню черевну стінку визначається, що вона щільна, дно розташоване на рівні пупка. Укажіть причину вторинної (пізньої) післяпологової кровотечі.

- A.** Затримка частин плаценти в порожнині матки
- B.** Порушення згортальної системи крові
- C.** Розрив промежини
- D.** Розрив шийки матки
- E.** Розрив матки

116. Жінка в терміні вагітності 36-37 тижнів скаржиться на появу незначних кров'янистих виділень (кровомазань) зі статевих шляхів, що з'явилися раптово вночі у стані спокою. Об'єктивно спостерігається: загальний стан вагітної задовільний, АТ — 110/70 мм рт. ст., пульс — 70/хв, матка в нормотонусі, положення плода поздовжнє, передлежання головне, голівка розташована високо над входом у малий таз, серцебиття плода — 130/хв, ясне, ритмічне. Для якої патології характерні ці симптоми?

- A.** Передлежання плаценти
- B.** Передчасного відшарування нормально розташованої плаценти
- C.** Передчасних пологів
- D.** Провісників пологів
- E.** Загрози розриву матки

117. У якій зоні централізованого стерилізаційного відділення проводиться комплектація, пакування та стерилізація медичних виробів?

- A.** Чистій
- B.** Брудній
- C.** Стерильній
- D.** Режимній
- E.** Реєстраційній

118. Як називається форма медичної документації, призначена для реєстрації режиму перебування пацієнта в стаціонарі закладу охорони здоров'я та фіксації відомостей про медикаментозне лікування, методів обстеження, фізіотерапевтичних процедур тощо.

- A.** Листок лікарських призначень
- B.** Температурний листок
- C.** Консультативний висновок спеціаліста
- D.** Журнал обліку процедур
- E.** Реєстраційна генетична карта

119. Периферичну вену з якими властивостями доцільно обрати для проведення її безпечної катетеризації з метою подальшого введення ліків?

- A.** М'яку та еластичну на дотик
- B.** Тверду та склерозовану
- C.** Розташовувану на зап'ясті
- D.** Великого діаметру та деформовану
- E.** Розташовану поруч з артерією

120. За призначенням лікаря сестра медична проводить забір венозної крові пацієнта вакуумною системою. Які дії потрібно виконати із заповненою кров'ю пробіркою?

- A.** Акуратно перевернути її 5-8 разів для повного змішування її вмісту
- B.** Енергійно струсити до повного змішування її вмісту
- C.** Перелити її вміст в іншу ємність
- D.** Підігріти її вміст до температури 37°C
- E.** —

121. Укажіть особливості приймання ферментних препаратів.

- A.** Під час вживання їжі
- B.** Через 2 год після вживання їжі
- C.** Через 1 год після вживання їжі
- D.** Натщесерце
- E.** За 2 год до вживання їжі

122. У пацієнта, який хворіє на цироз печінки, розвинувся асцит. Яку пункцію йому доцільно провести для видалення патологічного вмісту (зайвої рідини) з черевної порожнини?

- A.** Абдомінальну
- B.** Плевральну
- C.** Люмбальну
- D.** Стернальну
- E.** —

123. У якому положенні має перебувати пацієнт протягом перших 2-х год після проведення люмбальної пункції?

- A.** Лежачи на животі
- B.** Лежачи на спині
- C.** Позиції Тренделенбурга
- D.** Позиції Фаулера
- E.** Позиції Сімса

124. Гірудотерапія — це метод лікування за допомогою медичних п'явок. Яке з нижченаведених захворювань є протипоказанням до застосування цього методу лікування?

- A.** Анемія
- B.** Плаукома
- C.** Тромбофлебіт
- D.** Гастрит
- E.** Бронхіт

125. Укажіть показання до застосування міхура з льодом.

- A.** Внутрішні кровотечі
- B.** Перший період гарячки
- C.** Спастичний біль
- D.** Трофічні ураження шкіри
- E.** Гостра затримка сечі

126. Укажіть найпоширеніше ускладнення, що є наслідком гострої ревматичної гарячки.

- A.** Набуті вади серця
- B.** Артеріальна гіпертензія
- C.** Розшарування аорти
- D.** Гострий коронарний синдром
- E.** Пароксизмальна тахікардія

127. У пацієнта кардіологічного відділення частота серцевих скорочень уповільнилася до 54/хв. Укажіть це порушення серцевого ритму.

- A.** Брадикардія
- B.** Тахікардія
- C.** Гіпертензія
- D.** Гіпотензія
- E.** Асистолія

128. У пацієнта пульмонологічного відділення розвинувся бронхообструктивний синдром. Укажіть провідну клінічну ознаку, що свідчить про його розвиток.

- A.** Експіраторна задишка
- B.** Інспіраторна задишка
- C.** Брадипное
- D.** Дихання Куссмауля
- E.** «Гавкаючий» кашель

129. Укажіть інгаляційний лікарський засіб, що застосовується для надання невідкладної медичної допомоги пацієнту під час нападу бронхіальної астми.

- A.** Сальбутамол
- B.** Ацетилцистеїн
- C.** Тобраміцин
- D.** Лібексин
- E.** Амброксол

130. Пацієнту, який хворіє на бронхіальну астму, з метою моніторингу функціонального стану дихальної системи призначено пікфлоуметрію. Який показник визначається за допомогою цієї діагностичної методики?

- A.** Пікова швидкість видиху
- B.** Життєва ємність легень
- C.** Об'єм форсованого видиху
- D.** Резервний об'єм вдиху
- E.** Резервний об'єм видиху

131. Пацієнт віком 40 років протягом останнього місяця скаржиться на слабкість, швидку втомлюваність, підвищення температури тіла до $37,3^{\circ}\text{C}$, нічну пітливість, погіршення апетиту, кашель із виділенням незначної кількості мокротиння, що легко відкашлюється. Під час опитування з'ясувалося, що пацієнт контактував з людиною, яка хворіє на туберкульоз. Яке дослідження доцільно провести пацієнту насамперед для встановлення діагнозу?

- A.** Рентгенографію органів грудної клітки
- B.** Спірографію
- C.** Бронхоскопію
- D.** Шкірні прик-тести
- E.** Визначення газового складу крові

132. Чоловіка, у якого через 1,5 год після вживання грибів виникли нудота, блювання та різка слабкість, шпиталізовано до лікарні. Який із нижченаведених медичних виробів потрібно підготувати для надання невідкладної медичної допомоги пацієнту?

- A.** Кухоль Есмарха
- B.** Підкладне судно
- C.** Тонometr Короткова
- D.** Газовивідну трубку
- E.** Апарат Боброва

133. Пацієнт віком 65 років хворіє на хронічний гепатит. Який із нижченаведених симптомів свідчить про розвиток у пацієнта синдрому холестазу?

- A.** Свербіж шкіри
- B.** Біль у кістках
- C.** Шум у вухах
- D.** Тризм жувальних м'язів
- E.** Екзофтальм

134. Яке скринінгове дослідження призначається пацієнтам, які хворіють на хронічну хворобу нирок, для оцінки функціональної здатності нирок?

- A.** Визначення швидкості клубочкової фільтрації
- B.** Визначення концентрації сечі
- C.** Виявлення формених елементів у сечі
- D.** Ультразвукове дослідження органів сечостатевої системи
- E.** Визначення нічного діурезу

135. Укажіть процедуру, що використовується для лікування хронічної хвороби нирок, під час якої кров пацієнта фільтрується через очеревину.

- A.** Перитонеальний діаліз
- B.** Гемодіаліз
- C.** Трансплантація нирок
- D.** Урографія
- E.** Цистоскопія

136. Який етіологічний фактор має вирішальне значення у розвитку гострого гломерулонефриту?

- A.** Інфікування β -гемолітичним стрептококом
- B.** Порушення обміну речовин
- C.** Споживання гострої та жирної їжі
- D.** Аутоімунні захворювання
- E.** Професійні інтоксикації

137. Пацієнт хворіє на деформуючий остеоартроз. Укажіть найефективніший захід для зменшення механічних навантажень на суглоби, що уповільнить прогресування деструктивних змін у хрящі.

- A.** Нормалізація маси тіла
- B.** Відмова від шкідливих звичок
- C.** Дотримання режиму дня
- D.** Дотримання харчового етикету
- E.** Поліпшення побутових умов

138. Жінка віком 36 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38°C , а також на відчуття розпирання, печіння та незначний біль у ділянці середньої третини правої гомілки. Об'єктивно спостерігається: набряк та еритема яскраво-червоного кольору з нерівними краями («язики полум'я») і чіткими (валик по периферії) контурами ураженої ділянки гомілки. Для якої патології характерні ці клінічні прояви?

- A.** Бешихи
- B.** Флегмони
- C.** Тромбофлебиту
- D.** Лімфангіоми
- E.** Дерматиту

139. Мати тримісячного хлопчика скар-

житись, що дитина стала неспокійною, погано спить, пітніє, особливо потилічна ділянка голови. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви та слизові оболонки бліді, облісіння потилиці. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A. Рахіту
- B. Анемії
- C. Спазмофілії
- D. Гіпотрофії
- E. Гіпотиреозу

140. Одинадцятирічному пацієнту встановлено діагноз: гострий гломерулонефрит. Який сечовий синдром характерний для цієї патології?

- A. Гематурія
- B. Міоглобінурія
- C. Бактеріурія
- D. Глюкозурія
- E. Білірубінурія

141. До медичного пункту батальйону скеровано бійця, який скаржиться на підвищення температури тіла до 38,3°C, утруднення під час відкривання рота та жування, тягнучий біль у м'язах спини та шиї. В анамнезі: вогнепальне поранення лівої гомілки тиждень тому. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, свідомість не порушена, шкіра бліда, посмикування м'язів обличчя, порушення ковтання, напруження м'язів потилиці, спини та кінцівок, пульс — 110/хв, АТ — 140/90 мм рт. ст. Для якої патології характерні ці клінічні прояви?

- A. Правця
- B. Сказу
- C. Ботулізму
- D. Сепсису
- E. Менінгіту

142. У пацієнтки, в якій розвинулося гостре порушення мозкового кровообігу, спостерігається відсутність рухів у лівих кінцівках із гіпертонусом м'язів та гіперрефлексією, визначається симптом Бабінського. Який вид рухового порушення спостерігається в пацієнтки?

- A. Центральна геміплегія
- B. Периферична геміплегія
- C. Центральний парепарез
- D. Моноплегія за периферичним типом
- E. Триплегія за центральним типом

143. Укажіть тривалість приймання ро-

донової ванни.

- A. 10-15 хв
- B. 5-7 хв
- C. 1-2 хв
- D. 30-40 хв
- E. 50-60 хв

144. Чоловік упродовж 10-ти років хворіє на дерматологічне захворювання, що загострюється в осінньо-зимовий період. Об'єктивно спостерігається: на шкірі волосистої частини голови та розгинальних поверхнях кінцівок візуалізуються рожево-червоні плями та бляшки, вкриті сухими сріблястими лусочками, супроводжуються незначним свербіжем. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Псоріазу
- B. Червоного плоского лишая
- C. Системного червоного вовчака
- D. Сухой себореї
- E. Нейродерміту

145. Які клінічні прояви найхарактерніші для гострого пієлонефриту?

- A. Гарячка, біль у поперековій ділянці
- B. Такікардія, сеча кольору «м'ясних помий»
- C. Гіпертензія, набряки
- D. Анурія, свербіж шкіри
- E. —

146. Який метод дослідження сечі використовується для визначення концентраційної функції нирок?

- A. За Зимницьким
- B. За Нечипоренком
- C. За Аддіс-Каковським
- D. За Амбурже
- E. —

147. Під час об'єктивного обстеження пацієнта сестра медична виявила, що на тлі сповільненого та рівномірного за глибиною дихання з'являються тривалі паузи (до 30 с). Який тип дихання спостерігається в пацієнта?

- A. Дихання Біота
- B. Інспіраторна задишка
- C. Експіраторна задишка
- D. Дихання Куссмауля
- E. Дихання Чейна-Стокса

148. Які фізіотерапевтичні процедури треба порадити пацієнту після зняття гіпсової пов'язки для відновлення функції травмованої нижньої кінцівки?

- A.** ЛФК, масаж
- B.** Зовнішнє застосування зігрівального компресу, медичної грілки
- C.** Гірудотерапію, голковколювання
- D.** УФО, електрофорез
- E.** Фототерапію, кріотерапію

149. Укажіть прояви дизуричного синдрому.

- A.** Часте болісне сечовипускання
- B.** Позитивний симптом Пастернацького
- C.** Піурія, протейнурія
- D.** Альбумінурія, кетонурія
- E.** Гіпертензія, набряки

150. Як називається патологічний стан, що характеризується болем у суглобі та не супроводжується запальним процесом та/або порушенням рухливості в ньому?

- A.** Арталгія
- B.** Артрит
- C.** Артроз
- D.** Поліартрит
- E.** Полікістоз