

1. Під час лабораторного дослідження мокротиння пацієнта виявлено спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена та еозинофіли. Для якого захворювання характерні такі лабораторні зміни в аналізі мокротиння?

- A. Бронхіальної астми
- B. Гострого бронхіту
- C. Бронхоектатичної хвороби
- D. Туберкульозу легень
- E. Сухого плевриту

2. Як називається метод неінвазивного дослідження функції зовнішнього дихання, що проводиться для оцінки стану легень та бронхів, діагностики захворювань дихальної системи та контролю їх лікування?

- A. Спірографія
- B. Бронхоскопія
- C. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки
- D. УЗД легень
- E. Шкірні алергологічні тести

3. Чоловік скаржиться на періодичні закрепи, випорожнення з домішками крові та переймоподібний біль у животі. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, живіт бере участь в акті дихання, м'який. У лівому підребер'ї пальпується щільне болюче утворення. Який інструментальний діагностичний метод використовується для дослідження всіх відділів товстого кишечника та взяття біопсії?

- A. Колоноскопія
- B. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини
- C. Іригоскопія
- D. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини
- E. Ректороманоскопія

4. Який вид анестезії доцільно застосувати під час оперативного лікування підшкірного панарицію?

- A. За Оберстом-Лукашевичем
- B. За Вишневським
- C. Термінальну
- D. Інфільтраційну
- E. Внутрішньокісткову

5. Жінка отримала опік передньої поверхні обох ніг, задньої поверхні тулуба та промежини. Визначте площу опікового ураження за «правилом дев'яток».

- A. 37%
- B. 25%
- C. 39%
- D. 51%
- E. 19%

6. У чоловіка після роботи з електроприладом на долоні правої руки візуалізується ділянка некрозу шкіри — біло-сіра пляма діаметром 4 мм. Який вид місцевої електротравми спостерігається в чоловіка?

- A. Електричний знак
- B. Металізація шкіри
- C. Електроофтальмія
- D. Електричний опік
- E. Механічне ушкодження

7. Чоловік віком 37 років скаржиться на нудоту, блювання, сухість у роті, відчуття «туману» перед очима, утруднення під час ковтання. Вказані симптоми з'явилися через добу після вживання в'яленої риби. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A. Ботулізму
- B. Харчової токсикоінфекції
- C. Сальмонельозу
- D. Шигельозу
- E. Поліомієліту

8. Щеплення новонароджених дітей від туберкульозу проводиться шляхом внутрішньошкірного введення вакцини БЦЖ. Яке ускладнення розвивається у разі випадкового потрапляння вакцини під шкіру?

- A. «Холодний абсцес»
- B. Ліподистрофія
- C. Олійна емболія
- D. Виразка
- E. Інфільтрат

9. Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C, головний біль та різкий розпираючий біль у ділянці задньої поверхні шиї. Об'єктивно спостерігається: на ураженій ділянці шиї візуалізується щільний інфільтрат темно-червоного кольору, діаметром 7-8 см, різко болючий під час пальпації, вкритий дрібними множинними отворами, із яких виділяється гнійна рідина (симптом «сита»). Який запальний процес розвинувся в пацієнта?

- A.** Карбункул
- B.** Фурункул
- C.** Бешиха
- D.** Фурункульоз
- E.** Гідраденіт

**10.** У дівчини віком 19 років на шкірі грудної клітки, шиї, бічних поверхонь тулуба, міжлопаткової ділянки та плечей виявлено численні незапальні плями жовтувато-коричневого та блідо-рожевого кольору. Позитивні «симптом стружки» (лущення плям у разі пошкрябування) та йодна проба Бальцера. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A.** Висівкоподібного лишая
- B.** Контактного простого дерматиту
- C.** Справжньої екземи
- D.** Токсикодермії
- E.** Мікроспорії

**11.** Результати клінічного (загального) аналізу сечі пацієнта такі: сеча каламутна, з пластівцями та осадом, лейкоцитурія, бактеріурія, протеїнурія (менше 1 г/л). Для якого захворювання характерні такі лабораторні зміни в аналізі сечі пацієнта?

- A.** Гострого пієлонефриту
- B.** Гострого гломерулонефриту
- C.** Хронічного гломерулонефриту
- D.** Сечокам'яної хвороби
- E.** Хронічної ниркової недостатності

**12.** Чоловіку віком 34 роки встановлено попередній діагноз: менінгококовий менінгіт та з діагностичною метою призначено спинномозкову пункцію. Який медичний інструмент треба підготувати сестрі медичній для проведення цієї процедури?

- A.** Голку Біра
- B.** Голку Касирського
- C.** Голку Дюфо
- D.** Троакар
- E.** Біопсійну голку

**13.** Які параметри враховуються під час оцінювання ефективності пологової діяльності?

- A.** Частота, тривалість та інтенсивність перейм
- B.** Артеріальний тиск роділлі та частота серцевих скорочень плода
- C.** Розміри голівки плода та ступінь її конфігурації
- D.** Розміри площини входу в малий таз та зовнішньої кон'югати
- E.** —

**14.** Укажіть причину ранньої післяпологової кровотечі, яку можна виявити, оглядаючи послід.

- A.** Затримка частин плаценти в порожнині матки
- B.** Щільне прикріплення плаценти
- C.** Порушення зсідання крові
- D.** Защемлення плаценти
- E.** Порушення виділення плаценти

**15.** Чоловіку віком 37 років для лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки призначено фамотидин. Яка основна фармакологічна дія цього лікарського засобу?

- A.** Антисекреторна
- B.** Антигістамінна
- C.** Бактеріостатична
- D.** Бактерицидна
- E.** Спазмолітична

**16.** У чоловіка віком 28 років у ділянці верхньої губи візуалізуються гіперемія шкіри та дрібні міхурці з гнійним змістом, вкриті жовтими кірками, відмічається піднижньощелепний лімфаденіт. Для якої патології характерні вказані клінічні прояви?

- A.** Сикозу
- B.** Псоріазу
- C.** Мікроспорії
- D.** Бешихи
- E.** Вітиліго

**17.** Укажіть необхідне оснащення точки догляду за пацієнтом.

- A.** Диспенсер з антисептиком
- B.** Умивальник
- C.** Диспенсер із рідким милом
- D.** Диспенсер із паперовими одноразовими рушниками
- E.** Кран із ліктьовим механізмом

**18.** Який із нижченаведених методів дослідження є найінформативнішим у діагностиці бронхоектатичної хвороби?

- A.** Бронхографія
- B.** Ларингоскопія
- C.** Спірометрія
- D.** Бронхіальна артеріографія
- E.** Велоергометрія

**19.** Які лікарські засоби належать до списку «Б»?

- A.** Сильнодіючі
- B.** Отруйні
- C.** Наркотичні
- D.** Психотропні
- E.** Імунобіологічні

**20.** Як називається індивідуальна упаковка, що безпосередньо контактує з лікарським засобом та сприяє збереженню його основних властивостей?

- A.** Первинна
- B.** Вторинна
- C.** Загальна
- D.** Спеціальна
- E.** Зовнішня

**21.** Для якого захворювання характерний такий симптомокомплекс: «маскоподібне обличчя», кисетоподібні складки навколо рота, синдром Рейно?

- A.** Системної склеродермії
- B.** Червоного системного вовчачка
- C.** Вузликowego периартеріїту
- D.** Ревматоїдного артриту
- E.** Гострої ревматичної гарячки

**22.** У пацієнта після вживання лісових горіхів раптово виникли захриплість голосу, «гавкаючий кашель», утруднене дихання. Об'єктивно спостерігається: пацієнт стривожений, шкіра обличчя ціанотична, повіки та губи набряклі, щільні на дотик, свербіж не має, пульс — 84/хв, ритмічний, АТ — 110/70 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

- A.** Набряк Квінке
- B.** Кропив'янка
- C.** Дифтерійний круп
- D.** Анафілактичний шок
- E.** Аспірація стороннього тіла

**23.** Сестрі медичній у приміщеннях для зберігання лікарських засобів потрібно стежити за певними параметрами та щоденно фіксувати отримані дані у відповідній документації. Укажіть ці параметри.

- A.** Температура та вологість повітря
- B.** Терміни придатності лікарських засобів
- C.** Швидкість руху повітря та стерильність повітряного середовища
- D.** Яскравість природного та штучного освітлення
- E.** Справність сигналізації та камер відеоспостереження

**24.** Який розмір периферичного венозного катетера переважно використовується для внутрішньовенних інфузій у новонароджених дітей?

- A.** 26G
- B.** 14G
- C.** 16G
- D.** 18G
- E.** 20G

**25.** Яке співвідношення розчинника та активної речовини антибіотика використовується у разі стандартного розведення антибіотика?

- A.** 1 мл на 100 000 ОД
- B.** 2 мл на 200 000 ОД
- C.** 5 мл на 100 000 ОД
- D.** 2 мл на 100 000 ОД
- E.** 1 мл на 500 000 ОД

**26.** Який найпростіший фізіотерапевтичний метод використовується для надання долікарської допомоги потерпілій особі у перші 2-3 год після забою колінного суглоба без пошкодження шкіри?

- A.** Прикладання мішура з льодом до місця травми
- B.** Прикладання грілки до місця травми
- C.** Накладання зігрівального компресу
- D.** Накладання гірчичників
- E.** Занурення травмованої кінцівки в гарячу воду

**27.** Пацієнту призначено фізіотерапевтичну процедуру, під час якої (внаслідок змінення проникності судинної стінки) у шкірі виникають точкові мікрокрововиливи (петехії, плями), до складу яких входять біологічно активні речовини, що надають потужний стимулювальний ефект як на весь організм, так і на певну зону до повного їх розсмоктування. Яку процедуру призначено пацієнту?

- A.** Вакуум-терапію медичними банками
- B.** Накладання гірчичників
- C.** Застосування медичної грілки
- D.** Накладання зігрівального компресу
- E.** УВЧ-терапію

**28.** Який із нижченаведених фізіотерапевтичних засобів місцевого впливу можна використати для допомоги пацієнту, в якого триває друга стадія гарячки?

- A.** Міхур із льодом
- B.** Медичні банки
- C.** Гірчичники
- D.** Медичну грілку
- E.** Зігрівальний компрес

**29.** Пацієнту, який хворіє на залізодефіцитну анемію, призначено терапію препаратами заліза. Одночасне приймання якого вітаміну покращує всмоктування та засвоєння заліза?

- A.** Аскорбінової кислоти
- B.** Ціанокобаламіну
- C.** Піридоксину
- D.** Кальциферолу
- E.** Токоферолу

**30.** У пацієнтки перебіг цукрового діабету ускладнився розвитком синдрому діабетичної стопи. Які поради по догляду за нижніми кінцівками необхідно надати пацієнтці?

- A.** Не ходити босоніж
- B.** Користуватися пемзою
- C.** Носити відкрите взуття
- D.** Використовувати тальк
- E.** Приймати гарячі ванни для ніг

**31.** У якому віці згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні проводиться четверте щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця дітям?

- A.** 18 місяців
- B.** 12 місяців
- C.** 6 років
- D.** 6 місяців
- E.** 3 роки

**32.** Для якого захворювання характерні такі клінічні прояви: гострий початок, слабо виражені катаральні явища, дрібний блідо-рожевий плямисто-папульозний висип, без тенденції до злиття, з переважною локалізацією на спині, сідницях та розгинальних поверхнях верхніх кінцівок, системне збільшення лімфатичних вузлів?

- A.** Краснухи
- B.** Кору
- C.** Скарлатини
- D.** Вітряної віспи
- E.** Менінгококової інфекції

**33.** Укажіть місце перебування породілля упродовж найближчих двох годин після завершення фізіологічних пологів.

- A.** У пологовій залі
- B.** У післяпологовому відділенні
- C.** У гінекологічному відділенні
- D.** У відділенні патології вагітних
- E.** У відділенні екстрагенітальної патології

**34.** У жінки віком 25 років після переохолодження з'явилися скарги на загальну слабкість, озноб, підвищення температури тіла до 38,5°C та тупий біль у поперековій ділянці з правого боку. Об'єктивно спостерігається: симптом Пастернацького позитивний праворуч, сеча каламутна, з гнійним осадом. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A.** Гострого пієлонефриту
- B.** Гострого гломерулонефриту
- C.** Сечокам'яної хвороби
- D.** Гострого циститу
- E.** Амілоїдозу нирок

**35.** Пацієнтка скаржиться на зміну гостроти зору, двоїння в очах, погіршення сну, пітливість, дратівливість, зменшення маси тіла за збереженого апетиту. Об'єктивно спостерігається: тремор рук і тіла, пульс — 110/хв, екзофтальм, збільшення розмірів щитоподібної залози. Попередній діагноз: дифузний токсичний зоб. Який із нижченаведених факторів посідає перше місце серед можливих причин розвитку цього захворювання?

- A.** Психотравма
- B.** Порушення дієти
- C.** Шкідливі звички
- D.** Переохолодження
- E.** Куріння

**36.** Який із нижченаведених факторів ризику зумовлює виникнення серцево-судинних захворювань у людей віком понад 40 років?

- A.** Гіперхолестеринемія
- B.** Диспротеїнемія
- C.** Анемія
- D.** Спадковість
- E.** Вірусні інфекції

**37.** У пульмонологічному відділенні лікується пацієнт із діагнозом: бронхоектатична хвороба. Який метод фізіотерапії використовується для покращення відходження слизу та мокротиння з дихальних шляхів?

- A.** Постуральний дренаж
- B.** Кріотерапія
- C.** Фонофорез
- D.** Парафінові аплікації
- E.** Зігрівальні компреси

**38.** У гастроентерологічному відділенні лікується пацієнт із діагнозом: виразкова хвороба шлунка. Які лікарські засоби пригнічують секрецію шлункового соку?

- A.** Інгібітори протонної помпи
- B.** Антигістамінні
- C.** Антибактеріальні
- D.** Антацидні
- E.** Нестероїдні протизапальні

**39.** Укажіть співвідношення денного діурезу до нічного в нормі.

- A.** 3:1
- B.** 1:3
- C.** 1:1
- D.** 1:4
- E.** —

**40.** Пацієнт скаржиться на втрату апетиту, гіркий присмак у роті, біль і відчуття тяжкості у правому підбер'ї, жовтяничність шкіри і склер, свербіж шкіри, біль у суглобах. За результатами біохімічного дослідження крові виявлено: високий рівень прямого білірубіну, виражена активність аланінамінотрансферази. Для якого захворювання характерні вказані клініко-лабораторні показники?

- A.** Хронічного гепатиту
- B.** Хронічного панкреатиту
- C.** Гострого гастриту
- D.** Хвороби Крона
- E.** Виразкової хвороби шлунка

**41.** Який із нижченаведених чинників сприяє розвитку виразкової хвороби?

- A.** Стрес
- B.** Переохолодження
- C.** Ожиріння
- D.** Молодий вік
- E.** Алергени

**42.** У пацієнта, який перебуває в реанімаційному відділенні, спостерігається хвилеподібна зміна амплітуди дихання з паузами між хвилями 40-50 с. Укажіть патологічний тип дихання.

- A.** Чейна-Стокса
- B.** Куссмауля
- C.** Біота
- D.** Задуха
- E.** Апноє

**43.** Пацієнту встановлено діагноз: гострий пієлонефрит. Чим зумовлений біль у поперековій ділянці, що характерний для цього захворювання?

- A.** Розтягненням ниркової капсули
- B.** Корінцевим синдромом
- C.** Уремією
- D.** Підвищенням артеріального тиску
- E.** Дизуричними розладами

**44.** Яка з нижченаведених груп лікарських засобів використовується для етіотропного лікування хронічного пієлонефриту?

- A.** Антибактеріальні
- B.** Антитромботичні
- C.** Антигістамінні
- D.** Нестероїдні протизапальні
- E.** Діуретики

**45.** Для якого захворювання нирок характерний такий симптомокомплекс: підвищення артеріального тиску, олігурія, набряки?

- A.** Гострого гломерулонефриту
- B.** Сечокам'яної хвороби
- C.** Гострої ниркової недостатності
- D.** Хронічного пієлонефриту
- E.** Хронічної ниркової недостатності

**46.** Реабілітаційна програма для збереження функції уражених суглобів у пацієнтів із ревматоїдним артритом зазвичай включає різні методи лікування. Укажіть метод, що спрямований на поліпшення рухливості та функції суглобів.

- A.** Механотерапія
- B.** Міостимуляція
- C.** Вісцеральна терапія
- D.** Пневмопресинг
- E.** Вакуумний масаж

**47.** Тяжкохворий пацієнт хоспісу перебуває на ліжковому режимі. З якою метою використовується шкала Braden під час догляду за пацієнтом?

- A.** Оцінювання ступеня виникнення ризику пролежнів
- B.** Розрахунку індексу маси тіла
- C.** Оцінки психоемоційного стану
- D.** Корекції психоемоційного стану
- E.** Планування реабілітаційних заходів

**48.** У чоловіка після вживання цитрусових з'явився висип на шкірі у вигляді червоних плям різних розмірів і форми, що супроводжується свербіжем. Для якої патології характерні ці клінічні прояви?

- A.** Кропив'янки
- B.** Псоріазу
- C.** Системного червоного вовчака
- D.** Сироваткової хвороби
- E.** Екземи

**49.** Дієтотерапія — це метод лікування за допомогою раціонального харчування. Що означає принцип заміщення в дієтотерапії?

- A.** Уведення в раціон харчування продуктів, у компонентах яких організм має дефіцит
- B.** Збалансування раціону харчування щодо білків, жирів, вуглеводів
- C.** Виключення з раціону харчування їжі, багатой на клітковину
- D.** Уникання можливості вживання продуктів, забруднених мікробами
- E.** Вживання продуктів харчування з тривалим терміном придатності

**50.** У якому періоді менструального циклу найчастіше виникає апоплексія яєчника?

- A.** У період овуляції
- B.** У період менструації
- C.** У фолікуліновій фазі
- D.** У лютеїновій фазі
- E.** У період регресу жовтого тіла

**51.** У породіллі через тиждень після пологів підвищилася температура тіла до 39°C, з'явилися біль унизу живота, озноб, нудота, головний біль. Під час гінекологічного дослідження виявляю-

ться гнійні виділення з цервікального каналу, потовщення, набряки та біль у ділянці придатків матки. Яке захворювання розвинулося в жінки?

- A.** Сальпінгоофорит
- B.** Лохіометра
- C.** Ендометрит
- D.** Пельвіоперитоніт
- E.** Перитоніт

**52.** У пацієнта після внутрішньовенного введення антибіотика розвинувся анафілактичний шок. Який препарат використовується насамперед для надання невідкладної допомоги пацієнту?

- A.** Епінефрин
- B.** Нітрогліцерин
- C.** Кофеїн
- D.** Дротаверин
- E.** Фуросемід

**53.** Пацієнтка віком 59 років скаржиться на слабкість у правій верхній та нижній кінцівках, утруднення мовлення, порушення зору. Об'єктивно спостерігається: АТ — 190/90 мм рт. ст., пульс — 72/хв, ритмічний, гіпертонус м'язів правих кінцівок, моторна афазія. За декілька годин спостереження симптоматика регресувала. Для якої патології характерні вказані клінічні прояви?

- A.** Транзиторної ішемічної атаки
- B.** Гіпертонічного церебрального кризи
- C.** Ішемічного інсульту
- D.** Геморагічного інсульту
- E.** —

**54.** У пацієнта розвинувся ангіоневротичний набряк. Лікарські засоби якої фармакологічної групи потрібно застосовувати для надання невідкладної допомоги пацієнту?

- A.** Антигістамінні
- B.** Анальгетики
- C.** Антихолінестеразни
- D.** Антациди
- E.** Антибіотики

**55.** Як називається спосіб комунікації, що передбачає цілеспрямоване використання словесних висловлювань (мовлення) для передачі інформації?

- A. Вербальна
- B. Невербальна
- C. Офіційна
- D. Дистанційна
- E. Виховна

56. Яка шкала використовується для догоспітальної діагностики гострого порушення мозкового кровообігу?

- A. FAST
- B. ABCDE
- C. NRS
- D. NIHSS
- E. MMSE

57. Який метод діагностики використовується для визначення прохідності вінцевих артерій?

- A. Коронарографія
- B. Електрокардіографія
- C. Ехокардіографія
- D. Пневмотахометрія
- E. Електроенцефалографія

58. Укажіть найінформативніший метод діагностики набутих вад серця.

- A. Ехокардіографія
- B. Пульсоксиметрія
- C. Спірометрія
- D. Ангіографія
- E. Реовазографія

59. Пацієнту віком 35 років встановлено діагноз: сухий плеврит. Які клінічні прояви характерні для цього захворювання?

- A. Біль у грудній клітці, що посилюється під час глибокого вдиху та нахила тулуба в протилежний бік
- B. Кашель із виділенням слизово-гнійного мокротиння, задишка, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр
- C. Експіраторна задишка, кашель із виділенням склоподібного в'язкого мокротиння
- D. Стискальний біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку, що триває близько 5 хв
- E. Кашель із виділенням гнійного мокротиння, переважно вранці, «повним ротом»

60. Для якого захворювання характерні такі клінічні прояви: гарячка, кашель (сухий, згодом вологий із виділенням слизово-гнійного мокротиння), посилення голосового тремтіння під час пальпації грудної клітки, задишка?

- A. Пневмонії
- B. Гострого бронхіту
- C. Спонтанного пневмотораксу
- D. Бронхіальної астми
- E. Гострого стенозуючого ларинготрахеїту

61. У пацієнта, який хворіє на рак легень, раптово, під час кашлю розпочалося виділення пінистої яскраво-червоної крові з рота. Які заходи долікарської допомоги доцільно розпочати негайно?

- A. Застосувати помірне охолодження грудної клітки
- B. Прикласти грілку на грудну клітку
- C. Дати вдихнути пари нашатирного спирту
- D. Промити шлунок
- E. Провести сліпе зондування

62. Який лікарський засіб використовується для надання невідкладної допомоги пацієнту у разі виникнення колапсу?

- A. Кордіамін
- B. Клофелін
- C. Фуросемід
- D. Папаверин
- E. Строфантин

63. Чоловік віком 54 роки скаржиться на зниження апетиту, біль у правому підбер'ї, нудоту, здуття живота, слабкість. Об'єктивно спостерігається: субіктеричність склер, «судинні зірочки» на шкірі, почервоніння долонь, на передній черевній стінці візуалізуються розширені підшкірні вени («голова медузи»), асцит. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A. Цирозу печінки
- B. Хронічного панкреатиту
- C. Хронічного гастриту
- D. Жовчнокам'яної хвороби
- E. Хронічного холециститу

64. Який вид гастриту (за характером патологічних змін слизової оболонки шлунка) може розвинутися в потерпілої особи внаслідок випадкового споживання концентрованої кислоти (зокрема оцтової кислоти)?

- A. Корозивний
- B. Катаральний
- C. Фібринозний
- D. Флегмонозний
- E. Еритематозний

**65.** У пацієнта розвинулися симптоми гострого гастриту в результаті споживання неякісної їжі. Які заходи долікарської допомоги необхідно надати пацієнту насамперед?

- A.** Промити шлунок
- B.** Прикласти грілку на епігастральну ділянку
- C.** Провести сліпе зондування
- D.** Прикласти міхур із льодом на епігастральну ділянку
- E.** Застосувати очисну клізму

**66.** Чоловік віком 52 роки скаржиться на сильний оперізувальний біль у верхній половині живота, нудоту, блювання, рідкі випорожнення, здуття живота та слабкість, які виникли після вживання спиртних напоїв та жирної їжі. Об'єктивно спостерігається: блідість і сухість шкіри, пульс — 92/хв, ритмічний, АТ — 110/70 мм рт. ст. Яке додаткове дослідження доцільно провести пацієнту з метою уточнення діагнозу?

- A.** Аналіз крові на  $\alpha$ -амілазу
- B.** Аналіз крові на глюкозу
- C.** Дуоденальне зондування
- D.** Аналіз калу на приховану кров
- E.** Загальний аналіз сечі

**67.** У пацієнта нефрологічного відділення під час лабораторного дослідження сечі виявлено: олігурію, гематурію, протеїнурію. В осаді сечі: нирковий епітелій, гіалінові та зернисті циліндри. Для якого захворювання нирок характерні ці лабораторні зміни?

- A.** Гострого гломерулонефриту
- B.** Сечокам'яної хвороби
- C.** Гострого пієлонефриту
- D.** Хронічного пієлонефриту
- E.** Гострого циститу

**68.** Укажіть основний синдром, що характерний для перебігу початкового періоду скарлатини.

- A.** Інтотоксикаційний
- B.** Геморагічний
- C.** Диспептичний
- D.** Бронхообструктивний
- E.** Менінгеальний

**69.** Пацієнт віком 46 років скаржиться на різкий нападopodobний біль у поперековій ділянці з правого боку, що іррадіює в статеві органи та праве бедро, часте болюче сечовипускання, нудоту, блювання. В анамнезі: сечокам'яна хвороба. Об'єктивно спостерігається: па-

цієнт неспокійний, шкіра бліда, волога, температура тіла —  $36,7^{\circ}\text{C}$ , пульс — 92/хв, АТ— 100/60 мм рт. ст., симптом Пастернацького — позитивний праворуч. Які заходи долікарської допомоги необхідно надати пацієнту насамперед на догоспітальному етапі?

- A.** Прикласти грілку на поперекову ділянку
- B.** Прикласти холодний компрес на поперекову ділянку
- C.** Застосувати газовідвідну трубку
- D.** Промити шлунок
- E.** Провести катетеризацію сечового міхура

**70.** Пацієнтці віком 52 роки встановлено діагноз: системний червоний вовчак. Які з нижченаведених симптомів характерні для цього захворювання?

- A.** Еритематозний висип на спинці носа та вилицях у вигляді «метелика», біль у м'язах, підвищення температури тіла до фебрильних цифр
- B.** Летючий характер болю у великих суглобах, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр
- C.** Відчуття оніміння пальців рук, зниження чутливості кінцівок за типом «рукавичок» і «шкарпеток»
- D.** «Маскоподібне обличчя», кисетоподібні складки навколо рота, ущільнення шкіри кистей та розвиток їх контрактур
- E.** Ранкова скутість, біль у дрібних суглобах кистей і стоп, деформація суглобів

**71.** Як називається графічний запис вимірювання висоти стояння дна матки (ВДМ) з метою динамічного спостереження за зростанням плода, починаючи з 20-го тижня вагітності?

- A.** Гравідограма
- B.** Партограма
- C.** Кардіограма
- D.** Міограма
- E.** Токограма

**72.** Роділлю проінформовано про активне ведення третього періоду фізіологічних пологів, що передбачає введення утеротоніків — 10 ОД окситоцину. Який шлях його введення в цьому разі?



- A.** Внутрішньом'язово
- B.** Внутрішньошкірно
- C.** Внутрішньовенно струминно
- D.** Підшкірно
- E.** Ректально

**73.** Укажіть ЕКГ-ознаки, що характерні для нападу стенокардії.

- A.** Високий, гострий зубець Т, сегмент ST нижче ізолінії
- B.** Дугоподібний сегмент ST над ізолінією
- C.** Глибокий і широкий зубець Q
- D.** Низький вольтаж комплексу QRS
- E.** Високі зубці Р

**74.** Для якого клінічного варіанта інфаркту міокарда характерні відсутність больового синдрому та наявність сухого кашлю та прогресуючої задишки?

- A.** Астматичного
- B.** Ангінозного
- C.** Церебрального
- D.** Гастралгічного
- E.** Аритмічного

**75.** У пацієнта на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда у першу добу захворювання розвинулися такі симптоми: температура тіла —  $37,6^{\circ}\text{C}$ , підвищення рівня лейкоцитів, тропонінів, міоглобіну та С-реактивного протеїну у периферичній крові. Який синдром розвинувся в пацієнта?

- A.** Резорбтивно-некротичний
- B.** Менінгеальний
- C.** Гіпертензивний
- D.** Бронхообструктивний
- E.** Сидеропенічний

**76.** Розвиток якого патологічного стану вказує на те, що в пацієнта триває III стадія артеріальної гіпертензії?

- A.** Ниркової недостатності
- B.** Печінкової недостатності
- C.** Дихальної недостатності
- D.** Тиреотоксикозу
- E.** Діабетичної нефропатії

**77.** Для діагностики якого захворювання використовується реакція Ваалера-Роуза?

- A.** Ревматоїдного артриту
- B.** Системного червоного вовчка
- C.** Дерматоміозиту
- D.** Системної склеродермії
- E.** Деформуючого остеоартрозу

**78.** Дорослому пацієнту проведено вну-

трішньошкірну пробу Манту. На 3-тю добу в місці ін'єкції з'явилася папула діаметром 7 мм. Інтерпретуйте результат проби.

- A.** Позитивна
- B.** Негативна
- C.** Сумнівна
- D.** Гіперергічна
- E.** —

**79.** Укажіть найнебезпечніше ускладнення, що може розвинути в пацієнта під час блювання.

- A.** Аспірація шлункового вмісту
- B.** Відрижка шлунковим вмістом
- C.** Відрижка повітрям
- D.** Печія
- E.** Метеоризм

**80.** Пацієнт скаржиться на розпираючий біль унизу живота та неспроможність самотійно спорожнити сечовий міхур упродовж 10-ти годин. В анамнезі: сечокам'яна хвороба. Укажіть заходи невідкладної допомоги пацієнту в цьому разі.

- A.** Катетеризація сечового міхура
- B.** Прикладання міхура з льодом на низ живота
- C.** Літотрепсія (дроблення каменів у нирках)
- D.** Обмеження вживання харчової солі
- E.** Обмеження вживання рідини

**81.** Пацієнт скаржиться на інтенсивний біль і відчуття поколювання в руках, судоми в м'язах кистей. З анамнезу відомо, що пацієнт протягом 10-ти років працює забійником у шахті. Об'єктивно спостерігається: кисті ціанотичні, холодні на дотик, зниження больової чутливості за типом «рукавичок». Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A.** Вібраційної хвороби
- B.** Пневмоконіозу
- C.** Ревматоїдного артриту
- D.** Системної склеродермії
- E.** Цукрового діабету

**82.** Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на періодичний біль унизу живота, незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів та затримку менструації впродовж 6-ти тижнів. Попередній діагноз: позаматкова вагітність. Рівень якого гормону доцільно дослідити в крові жінки для підтвердження цього діагнозу?

- A.** Хоріонічного гонадотропіну
- B.** Естрадіолу
- C.** Пролактину
- D.** Прогестерону
- E.** Окситоцину

**83.** Пацієнт віком 14 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $37,6^{\circ}\text{C}$ , пітливість, головний біль, загальну слабкість. В анамнезі: контакт із хворим на туберкульоз. У крові: лімфоцитоз, підвищення ШОЕ. Виявлено віраж туберкулінових проб. Який патологічний процес розвивається в організмі пацієнта?

- A.** Первинна туберкульозна інтоксикація
- B.** Первинний туберкульозний комплекс
- C.** Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів
- D.** Міліарний туберкульоз
- E.** Гострий бронхіт

**84.** У жіночій консультації вагітній жінці проведено пельвіометрію. Який розмір жіночого таза враховується у діагностиці (визначенні ступеня звуження) анатомічно вузького таза?

- A.** Справжня кон'югата
- B.** Міжостьова відстань
- C.** Міжгребенева відстань
- D.** Міжвертлюгова відстань
- E.** Зовнішня кон'югата

**85.** Жінка віком 35 років перебуває на 39-му тижні вагітності. Вагітність I, передбачувана маса плода — 4200 г. Діагностовано тазове передлежання плода. Яка тактика ведення пологів у цьому разі?

- A.** Кесарів розтин
- B.** Пологи через природні пологові шляхи
- C.** Накладання акушерських щипців
- D.** Вакуум-екстракція плода
- E.** —

**86.** У породіллі після пологів виявлено розрив задньої спайки та стінки піхви, а також шкіри промежини довжиною 1 см, м'язи промежини неушкоджені. Укажіть ступінь розриву промежини.

- A.** I
- B.** II
- C.** III
- D.** IV
- E.** —

**87.** Пацієнту, який хворіє на бронхоекстатичну хворобу, призначено масаж грудної клітки та дихальну гімнастику. Укажіть мету проведення цих процедур.

- A.** Полегшення процесу відходження мокротиння
- B.** Попередження кровохаркання
- C.** Полегшення больових відчуттів
- D.** Загартовування організму
- E.** Профілактика набряку легень

**88.** Вагітній жінці діагностовано тазове передлежання плода. У якому терміні вагітності можна виконати операцію зовнішнього повороту плода, для того, щоб вагітність закінчилася пологами через природні пологові шляхи?

- A.** 36 тижнів
- B.** 28 тижнів
- C.** 40 тижнів
- D.** 42 тижні
- E.** 38 тижнів

**89.** У роділлі триває латентна фаза першого періоду фізіологічних пологів. Пологи I, вагітність II, термін вагітності — 38 тижнів. Укажіть сучасний безпечний метод функціональної діагностики, який застосовується для одночасного динамічного спостереження за внутрішньоутробним станом плода та скоротливою здатністю матки.

- A.** Кардіотокографія
- B.** Електроміографія
- C.** Ультрасонографія
- D.** Сцинтиграфія
- E.** Електрокардіографія

**90.** У пацієнта одразу після введення вакцини з'явилися різка слабкість, запаморочення, прискорене серцебиття, утруднення дихання, відчуття страху смерті, шум у вухах. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, вкрита холодним потом, дихання часте, поверхневе, пульс — 120/хв, слабкого наповнення, АТ — 70/30 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

- A.** Анафілактичний шок
- B.** Гіповолемічний шок
- C.** Набряк Квінке
- D.** Напад бронхіальної астми
- E.** Кардіогенний шок

**91.** Для якого захворювання травної системи типові такі особливості болювого синдрому: біль в епігастрії з'являється натщесерце, вночі або через 3-4 год після останнього вживання їжі та зникає навіть після незначного вживання будь-яких продуктів харчування?

- A.** Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки
- B.** Виразкової хвороби шлунка
- C.** Хронічного атрофічного гастриту
- D.** Хронічного панкреатиту
- E.** Хронічного холециститу

**92.** У пацієнта, який довгий час хворіє на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, спостерігається зміна симптоматики: біль у животі став оперізувальним постійним, інтенсивним, припинив залежати від уживання їжі. Яке ускладнення основного захворювання, найімовірніше, розвинулося в пацієнта?

- A.** Пенетрація
- B.** Перфорація
- C.** Пілоростеноз
- D.** Малігнізація
- E.** Ахалазія кардії

**93.** Пацієнту встановлено діагноз: пептична виразка шлунка. Який із нижченаведених лікарських засобів, що входить до складу квадритерапії цього захворювання, пригнічує продукцію кислоти шлункового соку, сприяє зменшенню болювих відчуттів у шлунку та усуває печію?

- A.** Омепразол
- B.** Вісмуту субцитрат (де-нол)
- C.** Амоксицилін
- D.** Кларитроміцин
- E.** —

**94.** Жінка перебуває на 30-му тижні вагітності. Вагітність II, багатоплідна (монохоріональна моноамніотична двійня). Стан матері та плодів задовільний. Враховуючи тип розвитку двійні, жінку попередили, що пологи відбуватимуться шляхом кесаревого розтину. У якому терміні вагітності його оптимально провести в цьому разі?

- A.** 32 тижні
- B.** 38 тижнів
- C.** 36 тижнів
- D.** 37 тижнів
- E.** 40 тижнів

**95.** У пацієнтки, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу, після випадкового передозування інсуліну виникло відчуття голоду, з'явилися різка слабкість, запаморочення, занепокоєння, тремтіння рук, підвищене потовиділення, прискорене серцебиття. Свідомість збережена. Які заходи долікарської допомоги необхідно надати пацієнтці насамперед?

- A.** Запропонувати вжити прості вуглеводи (цукор, солодку воду)
- B.** Запропонувати прийняти 15-20 крапель корвалолу
- C.** Увести інсулін підшкірно
- D.** Застосувати нітрогліцерин сублінгвально
- E.** Дати вдихнути пари нашатирного спирту

**96.** Пацієнтка віком 56 років скаржиться на сухість у роті, невгамовну спрагу, загальну слабкість, постійне відчуття голоду, втрату маси тіла, свербіж шкіри, часте сечовипускання, порушення зору. Об'єктивно спостерігається: шкіра суха, лущиться, помітні сліди від подряпин, пульс — 78/хв, АТ — 150/85 мм рт. ст. Глюкоза крові — 8,4 ммоль/л. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні симптоми?

- A.** Цукрового діабету
- B.** Гіпотиреозу
- C.** Корости
- D.** Кропив'янки
- E.** Гіпертиреозу

**97.** Укажіть оптимальну температуру води для проведення очисної клізми пацієнту з атонічним закрепом.

- A.** 18-20°C
- B.** 25-30°C
- C.** 28-32°C
- D.** 37-38°C
- E.** 38-40°C

**98.** Сестра медична навчає пацієнта, якому діагностовано цукровий діабет 1-го типу, техніці введення інсуліну, зокрема наголошує на важливості дотримання точного дозування цього лікарського засобу. Яке ускладнення може розвинутися в пацієнта, якщо він отримуватиме недостатню дозу інсулі-

ну?

- A.** Гіперглікемія
- B.** Гіпоглікемія
- C.** Медикаментозна емболія
- D.** Ліподистрофія
- E.** Тромбофлебіт

**99.** У пацієнта, який хворіє на дифузний токсичний зоб, спостерігається симптом «телеграфного стовпа». Укажіть клінічні прояви цього симптому.

- A.** Тремор всього тіла
- B.** Переміжна кульгавість
- C.** Девіація язика
- D.** Атактична хода
- E.** Ністагм

**100.** Роділля, у якої триває другий період пологів, відчула різкий біль у ділянці дна матки. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, АТ — 90/60 мм рт. ст., пульс — 96/хв, матка в гіпертонусі, різко болюча, у ділянці її дна пальпується випинання. Положення плода поздовжнє, голівка розташована в порожнині малого таза, серцебиття плода — 180/хв, приглушене, аритмічне. Укажіть подальшу тактику ведення пологів.

- A.** Накладання акушерських щипців
- B.** Кесарів розтин
- C.** Стимуляція пологової діяльності
- D.** Плорудуїнівна операція
- E.** Спостереження за роділлею

**101.** Укажіть інструментальний ендоскопічний метод дослідження прямої та сигмоподібної кишок.

- A.** Ректороманоскопія
- B.** Колоноскопія
- C.** Іригоскопія
- D.** Фіброгастроскопія
- E.** Холангіографія

**102.** У пацієнта після укусу бджоли раптово виник сильний головний біль, з'явилися психоемоційне збудження, нудота, парестезії, а згодом — судоми з втратою свідомості та мимовільним сечовипусканням і дефекацією. АТ — 70/40 мм рт. ст. Який варіант анафілактичного шоку розвинувся в пацієнта?

- A.** Церебральний
- B.** Асфіктичний
- C.** Кардіогенний
- D.** Абдомінальний
- E.** Гемодинамічний

**103.** У пацієнта спостерігаються клінічні прояви харчової алергії. Яке з нижченаведених досліджень є найінформативнішим для встановлення причини алергії?

- A.** Шкірна скарифікаційна проба
- B.** Біопсія шкіри
- C.** Проба Манту
- D.** Загальний аналіз крові
- E.** Біохімічний аналіз крові

**104.** До перинатального центру у відділення інтенсивної терапії шпиталізовано вагітну жінку (вагітність II, термін вагітності — 37 тижнів) зі скаргами на постійний головний біль, погіршення зору, мерехтіння «мушок» перед очима, блювання, гострий біль в епігастрії. Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, генералізовані набряки, АТ — 170/110 мм рт. ст. У загальному аналізі сечі: протеїнурія — 3,5 г/добу. З анамнезу відомо, що підвищення АТ у жінки раніше не спостерігалось. Для якого патологічного стану характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A.** Тяжкої прееклампсії
- B.** Помірної прееклампсії
- C.** Гестаційної гіпертензії
- D.** Феохромоцитомі
- E.** Хронічної серцевої недостатності

**105.** Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на різкий біль у правій клубовій ділянці з іррадіацією в пряму кишку, короткочасне запаморочення, які виникли після фізичного навантаження. З анамнезу відомо, що остання менструація була 3 тижні тому, менструальний цикл регулярний, пацієнтка використовує бар'єрні методи контрацепції. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, АТ — 100/60 мм рт. ст., пульс — 90/хв, живіт напружений у нижніх відділах. Результати гінекологічного дослідження: слизова оболонка шийки матки блідо-рожевого кольору, матка не збільшена, щільної консистенції, безболісна, придатки матки праворуч різко болючі, зліва — без особливостей, заднє склепіння піхви згладжене, болюче, виділення зі статевих шляхів слизові. Який патологічний стан розвинувся в пацієнтки?

- A.** Апоплексія яєчника
- B.** Порушена позаматкова вагітність
- C.** Прогресуюча позаматкова вагітність
- D.** Гострий апендицит
- E.** Гострий сальпінгоофорит

**106.** Старша сестра медична інструктує своїх підлеглих щодо правил гігієни рук. Який тип нагадування на робочому місці є найефективнішим для активізації уваги?

- A.** Інформаційні плакати
- B.** Аудіоповідомлення
- C.** Конференції
- D.** Санбюлетні
- E.** Накази

**107.** Упродовж якого терміну часу потрібно провести обстеження на ВІЛ медичного працівника, у якого відбувся контакт із джерелом потенційного інфікування ВІЛ, пов'язаний із виконанням професійних обов'язків?

- A.** 5-ти днів
- B.** 14-ти днів
- C.** 1-го місяця
- D.** 2-х місяців
- E.** 3-х місяців

**108.** Сестра медична проводить сортування медичних відходів після виконання лікарських призначень. До якої категорії відходів належить первинна упаковка отруйного лікарського засобу?

- A.** C
- B.** B
- C.** D
- D.** A
- E.** —

**109.** Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги транспортує пацієнта з підтвердженим діагнозом: туберкульоз — до спеціалізованого закладу охорони здоров'я. Який бар'єрний засіб захисту від можливого інфікування необхідно застосувати членам бригади?

- A.** Респіратор
- B.** Хірургічну маску
- C.** Захисний екран
- D.** Хірургічні рукавички
- E.** Халат

**110.** Сестра медична проводить заміну та сортування постільної білизни тяжкохворого пацієнта. Класифікуйте ступінь забруднення текстильних виробів, якщо вони значно забруднені кров'ю та іншими біологічними виділеннями пацієнта?

- A.** IV
- B.** III
- C.** II
- D.** I
- E.** —

**111.** Пацієнту для лікування геморою призначено ректальне введення супозиторіїв із новокаїном. Укажіть особливості умов зберігання супозиторіїв.

- A.** За температури повітря не вище ніж 25°C
- B.** У темному місці
- C.** У сухому темному місці
- D.** У приміщенні з витяжною вентиляцією
- E.** В окремій шафі

**112.** За призначенням лікаря сестра медична проводить забір венозної крові пацієнта вакуумною системою. Які дії потрібно виконати із заповненою кров'ю пробіркою?

- A.** Акуратно перевернути її 5-8 разів для повного змішування вмісту
- B.** Енергійно струсити до повного змішування її вмісту
- C.** Перелити її вміст в іншу ємність
- D.** Підігріти її вміст до температури 37°C
- E.** —

**113.** Яке ускладнення може розвинути-ся в пацієнта під час проведення абдо-мінальної пункції у разі швидкого вида-лення великого об'єму рідини?

- A.** Колапс
- B.** Ушкодження внутрішніх органів
- C.** Пневмоторакс
- D.** Шлункова кровотеча
- E.** Блювання

**114.** Пацієнту з дихальною недостатні-стю призначено інгаляції кисню в об'є-мі понад 5 л/хв. Які дії потрібно викона-ти для уникнення висушування слизової оболонки рота та дихальних шляхів?

- A.** Зволожити кисень
- B.** Регулювати редуктор
- C.** Стежити за тиском
- D.** Підняти головний кінець ліжка
- E.** Обробити кисневий катетер олійним розчином

**115.** Під час догляду та для допомо-ги пацієнту, у якого триває друга ста-дія гарячки (температура тіла — 39°C), сестра медична застосувала охолоджу-вальний компрес на лоб. Як часто його

необхідно змінювати?

- A. Кожні 2-3 хв
- B. Через 1 год
- C. За вимогою
- D. Раз на добу
- E. Кожні 30 хв

**116.** Пацієнту встановлено діагноз: гострий лейкоз та призначено медикаментозну терапію. Препарати якої групи порушують процеси росту, розвитку та механізми поділу всіх клітин організму, включаючи злоякісні?

- A. Цитостатики
- B. Антибіотики
- C. Кардіопротектори
- D. Гепатопротектори
- E. Противірусні

**117.** У пацієнта гематологічного відділення на шкірі тулуба візуалізується петехіально-плямистий висип різноманітного кольору (від пурпурно-червоного до зеленуватого і жовтого), у місцях стискання тулуба та кінцівок одягом — дрібні гематоми. В аналізі крові: тромбоцити —  $50 \cdot 10^9/\text{л}$ , час кровотечі подовжений. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A. Ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури
- B. Гемофілії А
- C. Гемолітичної анемії
- D. Лімфогранулематозу
- E. Хронічного мієлолейкозу

**118.** Укажіть частий побічний ефект, що може розвинути в пацієнта під час внутрішньовенного введення 1%-го розчину нікотинової кислоти.

- A. Відчуття жару в тілі
- B. Порушення зору
- C. Закреп
- D. Брадикардія
- E. Сонливість

**119.** Яка окружність талії в чоловіків асоціюється з високим ризиком розвитку артеріальної гіпертензії, хвороб серця, порушень вуглеводного обміну тощо?

- A. 102 см
- B. 90 см
- C. 88 см
- D. 60 см
- E. 75 см

**120.** Сестра медична, надаючи медичну допомогу пацієнту, в якого розвинувся напад стенокардії, застосувала нітроглицерин 0,5 мг сублінгвально. Укажіть фармакологічну властивість цього лікарського засобу.

- A. Розширює коронарні судини
- B. Розслабляє гладку мускулатуру бронхів
- C. Покращує метаболізм
- D. Підвищує силу і швидкість скоротливості міокарда
- E. Поліпшує функцію ендотелію

**121.** Укажіть типове ускладнення інтерстиціальної пневмонії.

- A. Пневмосклероз
- B. Кардіосклероз
- C. Легенева кровотеча
- D. Бронхіальна астма
- E. Емфізема легень

**122.** Дорослому пацієнту встановлено діагноз: бронхіальна астма. Який шлях введення ліків має перевагу під час надання невідкладної допомоги пацієнту у разі нападу бронхіальної астми?

- A. Інгаляційний
- B. Ентеральний
- C. Ректальний
- D. Ін'єкційний
- E. Сублінгвальний

**123.** У пацієнта, який хворіє на хронічний ентерит, упродовж 5-ти днів спостерігаються часті рідкі випорожнення (до 15 разів на добу) світло-жовтого кольору зі шматочками неперетравленої їжі. Пацієнт скаржиться на загальну слабкість, головний біль, запаморочення, апатію, спрагу, значну втрату маси тіла. Який патологічний процес розвивається в організмі пацієнта?

- A. Зневоднення (дегідратація)
- B. Дефіцит заліза
- C. Гіпергідратація (затримка води)
- D. Гіпокальціємія
- E. Дефіцит вітаміну D

**124.** Який режим фізичної активності необхідно забезпечити пацієнту, в якого спостерігається активна фаза перебігу хронічного пієлонефриту (температура тіла —  $39,0^{\circ}\text{C}$ , слабкість, біль у поперековій ділянці тощо)?

- A.** Ліжковий
- B.** Загальний
- C.** Активний
- D.** Палатний
- E.** Кімнатний

**125.** Який етіологічний фактор має вирішальне значення у розвитку гострого гломерулонефриту?

- A.** Інфікування  $\beta$ -гемолітичним стрептококом
- B.** Порушення обміну речовин
- C.** Споживання гострої та жирної їжі
- D.** Аутоімунні захворювання
- E.** Професійні інтоксикації

**126.** Пацієнт скаржиться на інтенсивний біль у першому плеснофаланговому суглобі, що виник уночі. Об'єктивно спостерігається: уражений суглоб набряклий, гіперемований, гарячий на дотик, рухи в ньому обмежені. У крові виявлено високий рівень сечової кислоти. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A.** Подагри
- B.** Панарицію
- C.** Хвороби Рейно
- D.** Ревматоїдного артрити
- E.** Первинного коксартрозу

**127.** Під час операції на неушкоджену шкіру сестри медичної, яка асистує лікарю, потрапила кров. Укажіть засіб, яким необхідно промити шкіру в цьому разі.

- A.** Водою з милом
- B.** Дезінфікуючим розчином
- C.** Антисептиком
- D.** Етиловим спиртом
- E.** Фізіологічним розчином

**128.** Пацієнту призначено підшкірне введення олійного розчину. Які дії має виконати сестра медична для попередження розвитку медикаментозної емболії під час виконання ін'єкції?

- A.** Перевірити, чи не потрапила голка в просвіт кровоносною судини
- B.** Перевірити кут і глибину введення голки
- C.** Промасажувати місце ін'єкції стерильною ватною кулькою
- D.** Змінювати місце ін'єкцій
- E.** Дотримуватися правил асептики

**129.** Пацієнту пульмонологічного відділення встановлено діагноз: пневмонія

— та призначено оксигенотерапію через носові канюлі. Через який інтервал часу рекомендується перевіряти стан носових канюль для забезпечення впевненості у їхній прохідності та можливості надходження кисню, а також контролю швидкості подачі кисню і його концентрації?

- A.** Кожні 8 год
- B.** Кожні 2 год
- C.** Кожні 3 год
- D.** Кожні 30 хв
- E.** Кожні 40 хв

**130.** Пацієнту в першу добу після травми показане прикладання міхура з льодом до місця ушкодження. Оберіть правильний режим його застосування, щоб уникнути місцевого переохолодження.

- A.** Кожні 20 хв робити перерву на 10-15 хв
- B.** Кожні 5 хв робити перерву на 20-30 хв
- C.** Кожні 40 хв робити перерву на 10-15 хв
- D.** Кожні 60 хв робити перерву на 20-30 хв
- E.** —

**131.** Під яким кутом потрібно ввести голку інсулінового шприца в підшкірно-жирову клітковину, якщо її довжина 10 мм?

- A.** 90°
- B.** 30°
- C.** 40°
- D.** 45°
- E.** 15°

**132.** Лікар-педіатр ЦПМСД встановив восьмирічній дитині діагноз: скарлатина. Який документ необхідно заповнити для обліку цього захворювання?

- A.** Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання
- B.** Медичну карту амбулаторного хворого
- C.** Контрольну карту диспансерного нагляду
- D.** Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів
- E.** Медичну карту стаціонарного хворого

**133.** У чоловіка віком 62 роки після стресу раптово розвинулися загальна слабкість, прискорене серцебиття та різкий стискальний біль за грудниною, що іррадіює в ліву руку та не минає

після приймання нітрогліцерину. Який патологічний стан, найімовірніше, розвинувся в пацієнта?

- A.** Інфаркт міокарда
- B.** Напад стенокардії
- C.** Печінкова коліка
- D.** набряк легень
- E.** Міокардит

**134.** До приймального відділення шпиталізовано жінку віком 28 років у неприємному стані. Зі слів родичів з'ясувалося, що вона хворіє на цукровий діабет, 3 дні тому її стан погіршився, з'явилися нудота, блювання, біль у животі, сонливість. Об'єктивно спостерігається: шкіра суха, запах ацетону з рота, ЧД — 30/хв, пульс — 100/хв, слабкого наповнення, АТ — 85/55 мм рт. ст. Для якого виду коми характерні ці клінічні прояви?

- A.** Гіперглікемічної
- B.** Гіпоглікемічної
- C.** Церебральної
- D.** Уремічної
- E.** Печінкової

**135.** Чоловіку віком 40 років встановлено попередній діагноз: геморагічний інсульт. У якому положенні потрібно транспортувати пацієнта до стаціонару?

- A.** На спині, з припіднятою головою
- B.** На спині, з припіднятими нижніми кінцівками
- C.** На правому боці
- D.** На животі, з підкладеним під грудну клітку валиком
- E.** Сидячи

**136.** Який вид пов'язки використовується для фіксації кінцівки у разі перелому ключиці без зсуву уламків?

- A.** Дезо
- B.** Т-подібна
- C.** Колосоподібна
- D.** Черепашача
- E.** Циркулярна

**137.** Пацієнт віком 18 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,2^{\circ}\text{C}$ , набряк і почервоніння правої щоки. Об'єктивно спостерігається: у ділянці правої щоки визначається інфільтрат, болючий під час пальпації, шкіра над ним напружена, гіперемована, у центрі інфільтрату візуалізується стрижень у вигляді сіро-зелених мас. Який запальний процес розвинувся в

пацієнта?

- A.** Фурункул
- B.** Карбункул
- C.** Гідраденіт
- D.** Абсцес
- E.** Флегмона

**138.** У пацієнта віком 20 років захворювання розпочалося гостро, з підвищення температури тіла до  $39,2^{\circ}\text{C}$ , сильного головного болю та болю у м'язах. Через декілька годин на шкірі тулуба та задньої поверхні стегон з'явився геморагічний висип зірчастої форми. Які менінгеальні симптоми потрібно перевірити в пацієнта насамперед?

- A.** Керніга, Брудзинського
- B.** Бабінського, Россалімо
- C.** Кера, Ортнера
- D.** Хвостека, Труссо
- E.** Пастернацького, Ровзінга

**139.** Пацієнтці віком 42 років встановлено діагноз: варикозна хвороба нижніх кінцівок. Укажіть найчастіше ускладнення цього захворювання.

- A.** Тромбофлебіт
- B.** Сепсис
- C.** Системна склеродермія
- D.** Параліч
- E.** Кардіосклероз

**140.** Пацієнт перебуває на стаціонарному лікуванні в травматологічному відділенні у зв'язку з переломом верхньої кінцівки. Укажіть правильну послідовність одягання натільної білизни (сорочки) на пацієнта в цьому разі.

- A.** Спочатку на хвору руку, потім на здорову руку, далі через голову і розправити
- B.** Через голову, потім на хвору руку, далі на здорову руку і розправити
- C.** Спочатку на здорову руку, потім на хвору руку, далі через голову і розправити
- D.** Через голову, потім на здорову руку, далі на хвору руку і розправити
- E.** Спочатку на хвору руку, потім через голову, далі на здорову руку і розправити

**141.** Укажіть місце накладання електрода із зеленим маркуванням під час проведення електрокардіографії.



- A. Ліва нога
- B. Права рука
- C. Права нога
- D. Ліва рука
- E. —

**142.** У пацієнта, який хворіє на хронічну ниркову недостатність, розвинулася уремія. Який із нижченаведених симптомів свідчить про розвиток цієї патології?

- A. Запах аміаку з рота
- B. Підвищення температури тіла
- C. Збільшення лімфатичних вузлів
- D. Гіперемія шкірних покривів
- E. Підвищення апетиту

**143.** Укажіть порушення діурезу, що характеризується зменшенням добової кількості сечі.

- A. Олігурія
- B. Поліурія
- C. Полакіурія
- D. Дизурія
- E. Ніктурія

**144.** Який із нижченаведених методів дослідження є найінформативнішим для діагностики туберкульозу легень?

- A. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки
- B. Загальний аналіз крові
- C. Спірометрія
- D. Стернальна пункція
- E. Біохімічний аналіз крові

**145.** Споживання продуктів зі збагаченим вмістом якого мікроелемента потрібно порекомендувати пацієнту, який хворіє на хронічну серцеву недостатність?

- A. Калію
- B. Кальцію
- C. Натрію
- D. Цинку
- E. Заліза

**146.** Пацієнт скаржиться на біль у на-

длобковій ділянці, неможливість випорожнити сечовий міхур. Сечовиділення відсутнє впродовж 12 год. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

- A. Гостра затримка сечі
- B. Ніктурія
- C. Ниркова коліка
- D. Поліурія
- E. Олігурія

**147.** Який суб'єктивний симптом найхарактерніший для кропив'янки?

- A. Свербіж шкіри
- B. Іктеричність шкіри
- C. Сльозотеча
- D. Ціаноз шкіри
- E. Мерзлякуватість

**148.** Укажіть метод ендоскопічного дослідження внутрішньої поверхні сечового міхура.

- A. Цистоскопія
- B. Бронхоскопія
- C. Ректороманоскопія
- D. Колоноскопія
- E. Езофагогастродуоденоскопія

**149.** Укажіть біологічно активну речовину, що міститься у секреті слинних залоз медичних п'явок.

- A. Гірудин
- B. Гепарин
- C. Гістамін
- D. Лізоцим
- E. Фібринолізин

**150.** Яка анатомічна ділянка тіла людини використовується для введення вакцини БЦЖ?

- A. Зовнішня поверхня верхньої третини лівого плеча
- B. Підлопаткова ділянка
- C. Верхній зовнішній квадрант сідниці
- D. Середня третина внутрішньої поверхні передпліччя
- E. Передня поверхня стегна